

## Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XIV.

12<sup>1)</sup>. *Carabus catenulatus* SCOP. De in de Ent. Ber. No. 86, 1 Nov. 1915, blz. 224, beschreven anthraciet-zwarte kleurafwijking uit Emmerik noem ik: a. *anthracinus* **nov. ab.**

40. *Omophron limbatus* F. Bij a. *disjunctus* D. TORRE is de eerste der drie golvende donkere dwarsbanden op de dekschilden tot drie stippen gereduceerd (niet incl. — mij niet bekend). Wel komen exemplaren voor, bij welken die band uit drie, niet samenhangende, deelen bestaat, waarvan de middelste breedte over den naad loopt. Zeer zelden komen exemplaren voor, bij welke de bronsgroene tint op de vlekken en banden totaal ontbreekt en deze deelen zwart zijn; ik noem deze a. *nigromaculatus* **nov. ab.** Ik ving deze bij Eibergen.

56. *Dyschirius aeneus* DEJ. Volkomen zwarte exemplaren, zonder eenig spoor van bronsglans, noem ik a. *niger* **nov. ab.** Ik zag exemplaren uit Doetinchem en Oisterwijk.

68. *Bembidion argenteolum* AHR. Terwijl bij a. *azureum* GEBL. (*chalybaeum* STRM.) de bovenzijde van het lichaam blauw of levendig blauwgroen is, is bij a. *amethystinum* MEIER de bovenzijde zwart, met violetten schijn en blauwen zijrand der dekschilden (niet incl.); groenachtige exemplaren noemt SCHILSKY a. *virens* (niet incl.); ook zijn donker loodgrauwe exemplaren bekend (niet incl.).

77. *Bembidion varium* OLIV. Blauwe tot blauwzwarte exemplaren zijn a. *nigrocyanicum* H. WAGN. (Ent. Mitt. v. 5, 1916). Deze werden enkele malen gevangen.

Den Haag.

ED. ÈVERTS.

## BIBLIOTHEEK.

### Nieuwe Aanwinsten.

BEMMELEN, J. F. VAN. Het kleurenpatroon der Diptera-vleugels. z. pl. (Versl. Wis. nat. afd. Kon. Acad. Wet. 1917, dl. 25).

COCKERELL, T. D. A. New tertiary insects. (Proc. U. S. Nat. Mus. 1917, vol. 52; no. 2181).

<sup>1)</sup> Beteekenis der nummers als in vorige „Lijsten”.