

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 103.

DEEL V.

1 Sept. 1918.

INHOUD: G. A. Graaf BENTINCK, Eenige in Nederland min of meer zeldzaam voorkomende Lepidoptera met bijbehorende vindplaatsen, en tevens eenige afwijkingen. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XVIII. — G. A. Graaf BENTINCK, *Hydrilla pallustris* Hb. — Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE, Adresverandering.

Eenige in Nederland min of meer zeldzaam voorkomende Lepidoptera met bijbehorende vindplaatsen, en tevens eenige afwijkingen.

Pieris napi L. var. *sabellicae*. Één ex. gevangen te 's Hage, 1908, met een vlucht van 35 m.m., zonder eenige zwartachtige vlekken, behalve aan de voorvleugelpunten.

Argynnis euphrosyne L. Deze soort heb ik gedurende de 3 laatste jaren (1916—1918) in de Lutte als zeer algemeen waargenomen. Zij is aldaar in overvloed te vangen en zal daar waarschijnlijk alle jaren algemeen voorkomen.

Chrysophanus dispar Hw. Van deze soort ving ik in 1917 in Friesland 2 ♂♂ en 1 ♀.

Thanaos tages L. Is in de Lutte zeer algemeen, en werd daar de laatste 3 jaren in overvloed gevangen.

Hemaris fuciformis L. Één ex. in de Lutte gevangen, vliegend in een bloemrijk weiland. Was nog niet uit Overijssel vermeld.

Hoplitis milhauseri F. In Amerongen en Leersum waarschijnlijk alle jaren zeer algemeen; overal zijn daar tegen beuken en eiken sporen van verlaten cocons te vinden;

een nog niet uitgevlogen ex. leverde mij in 1916 een zeer fraai ♂, dat zich pas in Juli ontpopte.

Drymonia querna F. Op dezelfde wijze als *Drym. trimacula* ving ik te Markelo 3 ex. van deze zeldzame soort en 3 dagen later te Hengelo nog één ex. tegen een eik. Beide soorten zijn nog niet uit Twente vermeld.

Drymonia trimacula ESP. Door middel van een 1500-kaars electrische lamp in een open veld op te stellen, omgeven door eiken, ving ik te Markelo, tezamen met een anderen verzamelaar, in den nacht van 7 op 8 Juni 1918: 13 stuks van deze zeer zeldzame soort, waarvan de meesten een witte achterrandshelft der voorvleugels hadden (var. *dodonea*).

Drymonia chaonia HB. 2 ex. gevonden in de Lutte, één in huis en één tegen een beuk. Deze soort was nog niet uit Twente vermeld.

Malacosoma neustria L. Een rups, die gedurende een maand niets eten wilde, en zich tenslotte verpopte, na heel klein te zijn geworden, leverde een ♀ met 22 m.m. vlucht. Normaal bedraagt deze 35—43 mm. Dit ex. was vaal gekleurd (de Lutte 1917).

Trichiura crataegi. L. 1 ex. te Amerongen in 1904 bij licht in huis gevangen. Is nieuw voor de prov. Utrecht.

Acronicta aceris L. var. *candelisequa* ESP. Van deze zeldzame var. kweekte ik 1 ex. uit de rups, gevonden te Amerongen, 1916.

Agrotis janthina ESP. Is bij Hengelo niet zeldzaam.

Agrotis umbrosa HB. Één ex. te Hengelo op smeer gevangen; is nieuw voor Overijssel (1917).

Agrotis occulta L. Één ex. in 1915 te Amerongen gevangen. Deze soort was reeds vroeger voor de prov. Utrecht te Dierbergen vastgesteld.

Pachnobia rubricosa F. 2 ex. te Hengelo in April 1918, met lamp en wit laken gevangen. Nieuw voor Overijssel.

Mamestra leucophaea VIEW. Een ex. te Amerongen tegen een beuk gevonden. Zeldzaam in Nederland.

Mamestra serena F. Een ex. te Enschedé, 1917. Nieuw voor Twente.

Dianthoecia nana ROTT. 2 ex. uit de Lutte. Nieuw voor Twente.

Dianthoecia compta F. 1 ex. te Vlissingen; nog niet uit Walcheren vermeld.

Chloantha polyodon CL. Van deze in Nederland zeer zeldzaam voorkomende soort, ving ik één ex. te Amerongen, 1914.

Nonagria cannae O. Te Amerongen bij licht gevangen en verder te Wolvega als rups, die een vlinder leverde. Nieuw voor Utrecht en Friesland.

Calamia lutosa HB. Als vlinder bij Hengelo in het riet met licht gevangen. Nieuw voor Overijssel.

Taeniocampa gracilis F. Is in Hengelo niet zeldzaam. Nieuw voor Overijssel.

Orrhodia ligula ESP. Eenige ex. in 1917 te Hengelo gevangen, waarvan de meeste: var. *polita* HB. (zeldzaam).

Orrhodia rubiginea F. Eenige ex. in 1917 te Hengelo gevangen. Nieuw voor Overijssel.

Xylina lamda TR. var. *zinckenii* komt op de gagelvelden bij Hengelo niet zeldzaam voor; eenige ex. in April 1918 met licht en wit laken gevangen.

Xylocampa areola ESP. 2 ex. in 1918 te Leersum tegen eiken gevonden; reeds vroeger uit Maarsbergen voor Utrecht vermeld (zeldzaam).

Erastria uncula CL. Eenige bij Hengelo gevangen (1917); nog niet uit Twente vermeld; zeer algemeen in Wolvega (F.).

Plusia pulchrina HW. 1 ex. in 1918 te Weldam (Markelo) met 1500-kaars elektrische lamp gevangen. Dit is waarschijnlijk het 4^e in Nederland buitgemaakte individu.

Euchloris pustulata HUFN. 1 ex. in 1918 te Hengelo gevangen (zeldzaam).

Lithosia sororcula HUFN. Één ex. in 1917 in de Lutte tegen een boom gevonden. Verder ving ik van deze soort op de wijze als bij *Not. trimacula* vermeld, dien avond te Weldam (gem. Markelo) vele ex. Is nieuw voor Overijssel.

Hepialus humuli L. In 1918 te Hengelo op smeer gevangen (vrij zeldzaam).

Hengelo (O.).

G. A. Graaf BENTINCK e. i.
