

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 107.

DEEL V.

1 Mei 1919.

INHOUD: J. LINDEMANS, *Stigmus Solskyi* Moraw. (Faun. nov. spec.) — J. LINDEMANS, Beleefd verzoek aan de leden. — C. A. L. SMITS VAN BURGST, In Nederland waargenomen Ichneumoniden (Hym.). — H. SCHMITZ S. J., Neue europäische Aphiochaeta-Arten III (Phoridae, Dipt.). — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopterenfauna, XXII. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Rupsenbeschrijvingen IV. — Dr. J. TH. OUDEMANS, De pop van *Pararge megaera* L. — R. VAN EECKE, *Papilio hector* L. van Sabang.

Stigmus Solskyi Moraw.

(Faunae nov. spec.).

Op de laatste wintervergadering der Nederl. Entom. Ver., te Rotterdam gehouden, ontving ik van ons geacht medelid, den heer P. J. M. SCHUIJT, een aantal door hem verzamelde Hymenoptera ten geschenke, waarvoor ik hem hier gaarne nogmaals openlijk dank zeg.

Onder het verzamelde vond ik een klein wespje, circa 4 mM. groot, en behoorende tot de familie *Sphegidae* (*Cra-bronidae*) of Graafwespen. Het bleek een mannelijk voorwerp van *Stigmus Solskyi* MORAW. te zijn en was geëtiketteerd: Rotterdam, 7 Juli 1902.

Volgens SCHMIEDEKNECHT, „Die Hymenopteren Mitteleuropas”, is deze soort zeldzaam, en komt zij meer in het Zuiden van Europa, doch ook in Zweden voor.

EDW. SAUNDERS, „The Hymenoptera Aculeata of the British Islands”, deelt mede, dat dit de eenige *Stigmus* is, welke in Engeland (“not very common”) voorkomt.

Aangezien de Naamlijst van SNELLEN VAN VOLLENHOVEN

in deel II der *Bouwstoffen*, alleen *Stigmus pendulus* PANZ. aangeeft, en ik geen latere opgaaf omtrent *Stigmus Solskyi* MORAW. heb kunnen vinden, vermeld ik deze soort als nieuw voor de fauna, zoodat onze fauna thans de beide bekende Europeesche soorten rijk is. De soorten van het genus *Stigmus* JUR. vangen bladluizen en nestelen in den grond.

Rotterdam.

J. LINDEMANS.

Beleefd verzoek aan de leden.

Daar ik mij den laatsten tijd in het bijzonder op de studie der inlandsche *Hymenoptera*, voornamelijk op die der familiën der *Sphegidae* (*Crabronidae*), Graafwespen, *Pompilidae*, Wegwespen, *Vespidae*, Plooiwespen, en *Chrysididae*, Goudwespen, toeleg, houd ik mij ten zeerste voor toezending van materiaal aanbevolen, liefst met opgaaf van vindplaats en datum.

Bij voorbaat mijn oprechten dank.

Rotterdam, Lange Warande 55a.

J. LINDEMANS.

In Nederland waargenomen Ichneumoniden (Hym.).

Bij eene in 't begin van de maand Maart gehouden telling der in Nederland waargenomen Ichneumoniden-species is gebleken, dat thans 986 verschillende soorten als inlandsch te boek staan.

Hiervan zijn 753 in de collectie van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen vertegenwoordigd, en 91 (alle faun. nov. spec.) in die van Dr. OUDEMANS te Putten; de overige soorten komen reeds op de door SNELLEN VAN VOLLENHOVEN in de jaren 1873 en 1876 gepubliceerde lijsten der Nederlandsche Hymenoptera voor.

Genoemde lijsten toonen aan, dat toen 606 verschillende Ichneumoniden-soorten bekend waren, zoodat sedert dien tijd het aantal inlandsche soorten met 380 vermeerderd is.

Uitvoerige lijsten zullen spoedig gepubliceerd worden.

Ginneken, Maart 1919.

C. A. L. SMITS VAN BURGST.