

Pamphilius nemorum GMEL. geheeten en onder dien naam ook door ENSLIN, p. 657, vermeld. Wij hebben dus alleen met de *Tenthredo* (oude verzamelnaam der bladwespen) *nemorum* van FABRICIUS te doen, door hem het eerst in zijne Entomologia Systematica, II, 1793, p. 111, No. 24, gebruikt. Dezen naam te onderdrukken, zou m. i. alleen zin hebben, als er nog eene andere *Lophyrus*-soort eveneens *nemorum* gedoopt geworden ware, welke ouder was en als zoodanig den voorrang had en behouden gebleven ware. De *Tenthredo nemorum* F. (1793) wordt echter door ENSLIN gesupprimeerd, omdat 3 jaar vroeger een andere auteur dien naam voor een geheel ander dier gebezigd heeft. Ik geloof niet, dat deze handelwijze juist is. De regelen voor de nomenclatuur zijn van de laatste jaren; men heeft dus bij elken naam thans na te gaan, hoe de geschiedenis daarvan is. En daar in het genus *Lophyrus* slechts ééne species den naam *nemorum* ontvangen heeft en deze de oudste voor die soort is, meen ik, dat die naam behouden dient te blijven. Volgens de andere opvatting zou, gelijk ENSLIN aanneemt, de soort in 1917 feitelijk nog onbenoemd zijn, weshalve hij toen den naam *Lophyrus nemoralis* ENSLIN schiep.

Putten, Augustus 1919.

J. TH. OUDEMANS.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna XXIV.

753. *Bryoporus cernuus* GRAV. Het type (met zwart halschild) werd door den heer A. KERKHOVEN bij Denekamp, Mei, gevangen en welwillend voor mijne collectie bestemd.

754. *Mycetoporus splendidus* GRAV. var. *longicornis* MÄKLIN (non MÄRKEL!). Bij Valkenburg, Juni, gevangen; door den heer F. RÜSCHKAMP S. J. welwillend voor mijne collectie bestemd. Ook volgens REITTER is deze vorm eene zelfstandige soort, welke zich, volgens GANGLBAUER, vooral door de seksueele kenmerken van het ♂ onderscheidt. In kleur even veranderlijk als *splendidus*. M. i. eerder eene var. van laatstgenoemde soort, wat ook het oordeel van FAUVEL is.

1188^{bis}. *Colon latum* KR. Bij Denekamp, Mei, door den

heer A. KERKHOVEN gevangen en door mij met dank van hem voor mijne collectie ontvangen.

1550^{bis}. *Agathidium nigrinum* ST. De *a. rubicundum* REITT. bij Valkenburg (Limb.), Mei, door den heer F. RÜSCHKAMP S. J. gevangen en welwillend voor mijne collectie aangeboden. Het type is nog niet uit Nederland bekend. In 1854 werd deze in de „Bouwstoffen” ten onrechte uit Utrecht opgegeven.

1562^{bis}. *Lathridius rugicollis* OLIV. Eveneens door den heer F. RÜSCHKAMP S. J. bij Valkenburg, Mei, gevangen. Met dank werd dit exemplaar voor mijne collectie bestemd.

2495. *Chrysomela menthastri* SUFFR. en 2496 *C. coerulea* SCRIBA (*violacea* PANZ.), welke laatste in 't vervolg *violacea* SCHALL.¹⁾ zou moeten heeten, zouden, volgens REITTER, tot eene en dezelfde soort: *violacea* PANZ. (nu: SCHALL.!) gerekend moeten worden; hiervan is dan *menthastri* SUFFR. eene variëteit. REITTER onderscheidt ze aldus:

Halsschild over het midden weinig dicht en zeer fijn bestippeld. Donkerblauw of violet; tarsen blauw (type), of metallisch groen; de schedel, de middellijn en drie uitvloeiende vlekken aan de basis van het halsschild, de naad en een langsband op de schijf der dekschilden, achter de schouderbuil, zoo ook de onderzijde gedeeltelijk blauw (*a. herbacea* DFES.; bij Valkenburg; zou ook bij Brummen gevangen zijn); of wel de bovenzijde levendig koperkleurig-goudglanzig; de schedel, de middellijn van het halsschild en drie bochtige vlekken aan de basis van het halsschild groenachtig-blauw; de naad der dekschilden en een langsband op de schijf blauw met groenen rand (*a. subfastuosa* MOTSCH., niet inl.). Lengte 6--9 mm. *coerulea* SCRIBA.

Halsschild over het midden dichter en sterker-, ook de dekschilden sterker en in meer verwarde rijen bestippeld. Levendig metallisch-groen (type), of groen met roodachtigen goudglans (bij Bunde, wijlen Mr. MAURISSEN), of fraai roodkoperglanzig (*a. resplendens* SUFFR. = *ignita* SUFFR. = *fulgida* MOTSCH., bij Kerkrade, ex. coll. LATIERS), of wel donkerblauw (*a. ruficollis* WEIDENB., niet inl.). Lengte 11 mm. . . var. *menthastri* SUFFR.

¹⁾ Zie: Dr. BISCHOFF, in: Deutsche Ent. Zeit. 1915, blz. 418.

2497. *Chrysomela fastuosa* SCOP. De donker bronskleurige overgangsvorm tot de geheel koolzwarte a. *melanaria* EVERTS, welke ik in Col. Neerl. II 435 vermeldde, is de door FLEISCHER beschrevene a. *obscura*; ook zijn bij onze exemplaren een langsband langs de zijden der dekschilden en meer of minder de achter- en zijranden van het halsschild meer groenachtig; de groene resten verdwijnen eindelijk geheel.

2551. *Crepidodera ferruginea* SCOP. (*exoleta* F.). Van deze soort bezit ik een totaal koolzwart (nigrino) exemplaar uit Doetinchem (ex. coll. GERDES); ik noem deze *melanaria nov. ab.* Van de aanverwante *C. transversa* MARSH. werden twee melanistische afwijkingen beschreven, n.l.: a. *melancholica* J. DAN., met donker pekbruinen kop, zwart halsschild en donker roodbruine dekschilden, met groote donkerder scutellairvlek, en a. *nigra* SCHILSKY, eenkleurig zwart, met bruinachtige tarsen (beiden niet inlandsch).

2559^{bis}. *Epitrix atropae* FOU DR. De in Lijst VII (in: Tijdschr. v. Entom. LIV, 1911) vermelde a., bij welke de dekschilden, door samenvloeiing der humerale- en apicale vlek, bijna of geheel geelbruin zijn, heet: *saturata* HEIKERTINGER.

2575. *Psylliodes obscura* DFTS., die tot nog toe als eene goede soort beschouwd werd, is, volgens HEIKERTINGER, niet als zoodanig van 2576. *Psyll. cuprea* KOCH te onderscheiden. De soort is brons- of geelkoperkleurig, zeldzamer bronzig-groen tot blauwgroen; bij a. *isatidis* HEIKERT.¹⁾ blauw tot groenachtig-blauw (op *Isatis tinctoria* L.). Halsschild evenals de geheele bovenzijde, als gevolg der fijne chagrineering, eenigszins zijdeglanzig, zeer fijn tot vrij sterk (d. i. a. *obscura* DFTS. = *herbacea* FOU DR.) bestippeld. De soort moet *P. cuprea* KOCH (*Foudrasi* BACH, *cupronitens* ALL.) heeten. Op *Cruciferen*, o. a. op *Sisymbrium officinale*. In het voorjaar ook op struiken; o. a. in Zuid-Limburg niet zeldzaam op hazelaar en meidoorn; overigens zeer verbreid.

2618. *Longitarsus anchusae* PAYK. Terwijl het type ongeveugeld is en de schouderbuilen mist, zijn deze laatste bij

¹⁾ In de Coleopt. Neerl. als a. *herbacea* FOU DR. (*cupronitens* ALL.) (sedert uit Maastricht en Valkenburg) aangeduid.

de gevleugelde var. *punctatissimus* FOU DR. duidelijk voorhanden. Zeldzamer dan het type.

2593. *Phyllotreta ochripes* CURT. De heer A. E. KERKHOVEN ving bij Vollenhoven (Overijssel), Aug., eene tot nog toe onbekende kleur-aberratie, bij welke de dekschilden totaal zwart zijn; bij goede belichting is op het uiteinde der dekschilden nog de schijn van een geel vlekje te zien, het eenige overblijfsel van de beide gele banden. Slechts de eerste drie sprietleedjes bij dit ♀ zijn roestrood. Ik noem deze: *Kerkhoveni* ab. nov., naar den ontdekker, die aan mij het ex. zoo welwillend voor mijne collectie afstond.

2629. *Longitarsus verbasci* PANZ. (*tabidus* WATERH.), heet bij HEIKERTINGER: *tabidus* FABR. (*verbasci* PANZ., WEISE). Exemplaren met zwartachtigen naadband heeten: a. *thapsi* MARSH.; komen daarbij eene zijdelingsche ronde vlek achter den schouder en eene langsvlek achter het midden, welke beiden kunnen samenvloeien, dan heeft men de a. *sisymbrii* FABR. voor zich. Beide a. niet het type.

2696. *Apoderus coryli* L. Exemplaren, bij welke het roode halsschild op het midden van eene zwarte vlek voorzien is, welke veelal tot eene zwarte middellijn gereduceerd is, heeten a. *denigratus* GMEL.; de pooten zijn hierbij allen zwart (niet inl.), of gedeeltelijk rood (niet zeldzaam). Wanneer hier de kop op onder- en bovenzijde of op den schedel rood is: a. *ruficeps* REY (niet inl.). Bij a. *collaris* SCOP. (*dauricus* LAXM.) is het halsschild eenkleurig rood, de dijen in het midden rood, de schenen zwart. Bij a. *avellanae* L., halsschild, dekschilden en pooten geheel rood (niet inl.).

2705. *Rhynchites purpureus* L. (*aequatus* L.) heet bij REITTER: *aequatus* L. (= *purpureus* GOEZE, *ruber* GEOFFR., *bicolor* ROSSI, *semiruber* STIERL.). De meeste exemplaren behooren tot a. *Paykulli* SCHILSKY (naad der dekschilden zwart, ook de pooten donker gekleurd).

2836^{bis}. *Minyops carinatus* L. Ik ontving, met dank, een ex. van den St. Pietersberg bij Maastricht (16 Mei 1886) van den heer H. J. H. LATIERS; het ex. stamt uit de collectie SCHOLS.