

Pimplinae.

Xorides collaris GRV. ♂, ♀, Valkenburg, Juni 1917 (A. J. ZÖLLNER).

Ophioninae.

Trichomma fulvidens WESM. 7 ♀♀, Breda, 11-V-1919 (LINDEMANS).

Deze soort, de grootste der Middel-Europeesche van dit geslacht, is direct aan het hooge, zadelvormig uitgeholde schildje te herkennen. Er vlogen een groot aantal exemplaren tusschen eikenhakhout, rondom bloeiende boschbes; ik vond geen enkel ♂.

Barylypa carinata BRISCHKE, 2 ♂♂, Leersum, 30-VI-1918 (LINDEMANS).

Vérder werden door den heer A. J. ZÖLLNER de volgende zeldzame soorten gevangen:

Ichneumon lacteator GRAV. 1 ♂, Valkenburg, Juni 1918. Deze soort wordt door den heer SNELLEN VAN VOLLENHOVEN in zijn Nieuwe naamlijst, 2^e stuk, pag. 149 (Tijdsch. voor Entom., deel 16 (1873)) vermeld. 1 ♂ Leiden, RITS.,

Thalessa curvipes GRV. 4 ♀♀, Valkenburg, Juni 1918. (In dezelfde lijst, pag. 172, vermeld 3 ♂♂ in Zeeland, HERKL.).

Rotterdam, November 1919.

J. LINDEMANS.

Rectificatie.

1. In de Entom. Berichten No. 16 van 1 Maart 1904, p. 128, wordt *Carabus monilis* var. *interruptus* BEUTHIN als voorkomende bij Tiel en Oosterbeek vermeld. Bij een revisie der exemplaren blijkt, dat deze opgave op een vergissing berust; bij de bedoelde exemplaren zijn niet de secundaire ribben in langwerpige bultjes opgelost, doch de tertraire ketenrijen geheel, of grootendeels uitgewischt.

2. In de Entom. Berichten No. 51 van 1 Januari 1910 wordt *Atheta contristata* Kr. als nieuw voor de fauna vermeld. Het exemplaar, waarop deze opgave betrekking had, is echter in de collectie van Dr. EVERTS niet meer te vinden, zoodat het later vermoedelijk als twijfelachtig ter zijde gesteld is. Deze soort is dus vooralsnog niet met zekerheid als inlandsch bekend.

Rotterdam.

UYTTENBOOGAART.
