

van den gastheer, waarop wel de aandacht gevestigd mag worden. Een exemplaar uit Linz am Rhein, van Dr. EVERTS ontvangen, en nog van WASMANN afkomstig, is, evenals de daarbij aanwezige mier, beslist veel lichter.

Tweede naschrift.

Volgens de opvatting van Dr. EVERTS zijn de *Dinarda* en de *Formica* van Otterlo dáárom donker, omdat zij goed uitgekleurd zijn, terwijl de Duitsche exemplaren, zoowel van kever als van mier, nog immatuur zijn.

Amsterdam.

D. MAC GILLAVRY.

Pompilidae, nieuw voor onze fauna.

Priocnemis (Salius) minutus LIND.

Van deze soort vingen de heer HAVERHORST en ik op eene zandige helling bij Breda 7-9-1919 elk 1 ♀ in gezelschap van *Miscophus bicolor* JUR., *Mutilla rufipes* F. ♀♀ en *Myrmosa melanocephala* F. ♀♀. — Op het eerste gezicht doet *Priocnemis minutus* LIND. aan een vertegenwoordiger van het geslacht *Agenia* SCHDTE. denken, daar de voorvleugels twee donkere banden dragen. SCHMIEDEKNECHT (Die Hym. Mitteleuropas pag. 258) zegt van deze soort: „Selten und wenig beobachtet”. Niet uit Engeland bekend.

Pompilus venustus WESM. 1 ♀, Wassenaar, 30-7-1917 (LINDEMANS). Deze fraaie soort is direct aan den sterk uitgeholden, aan beide zijden tandvormig uitspringenden metathorax te herkennen. SCHMIEDEKNECHT zegt over de verbreiding van deze soort, „Süd-europa bis Südtirol”, doch WESMAEL vermeldt dezelve uit België. {Niet uit Engeland bekend.

Rotterdam, November 1919.

J. LINDEMANS.

Corrigenda.

In de Entom. Berichten, Deel V, No. 110, 1 Nov. 1919, blz. 197, staat: 349^{ter} *Callicerus fulvicornis* EPELSH.; lees 549^{ter}, te plaatsen op blz. 198, na 358.

Den Haag.

ED. EVERTS.