zijn de dekschilden geheel roestrood (niet inl.). In Engeland wordt deze soort in de nesten van *Colletes Daviesana* aangetroffen, eene bijensoort, welke ook in Nederland bekend is.

2486bis. *Chrysomela analis* L. De heer G. VAN ROON ving bij Denekamp, Aug., een exemplaar van de a. *lomata* HERBST, dat mij, met mijn dank, voor mijne collectie aangeboden werd. Deze soort zou geen *Chrysomela,* maar een *Hydrothassa* THOMS., naverwant aan *aucta*, zijn.

2488bis. *Chrysomela quadrigemina* SUFFR. (*gemellata* ROSSI). Deze werd, in navolging van oudere auteurs, in mijne Col. Neerl. II, 434, als var. van *hyperici* FORST. geduid. Volgens WEISE en REITTER wordt zij als eene sp. prop. beschouwd. Door FR. RÜSCHKAMP S. J. werd bij Valkenburg (Limb.), Oct., een typisch exemplaar gevangen en mij, met mijn dank, voor mijne collectie aangeboden. J. WEISE wijst er op, dat de forceps bij het ♂ meer overeenstemt met dien van *Chr. geminata* PAYK., dan met dien van de zoo naverwante *hyperici.* Zij komt eveneens op *Hypericum perforatum* voor.

3137. *Apion Spencei* KIRBY, a. *nigrum* GERH., door Mr. D. UYTTENBOOGAART bij Oisterwijk, Sept., gevangen en welwillend voor mijne collectie bestemd.

De dekschilden zijn hier nagenoeg zwart.

3201. *Cryphalus* (*Hypothenemus*) *Künnemanni* REITT. (zie: Col. Neerl. II, p. 756, noot [1])). Dr. D. MAC GILLAVRY ontving deze soort uit Para-noten in Amsterdam; eenige exemplaren werden, met mijn dank, voor mijne collectie bestemd. De soort is gemiddeld iets kleiner ($1^1/_5$ mM.) dan *Hampei* FERRARI (uit koffieboonen). Het halsschild is soms lichter bruin; sprieten en pooten geel.

Den Haag. ED. EVERTS.

Het geslacht Tiphia, F. (Scoliidae).

In het werk van Dr. J. TH. OUDEMANS: De Nederlandsche Insecten, en door J. P. THYSSE: in De Levende Natuur, deel V, worden van dat geslacht drie soorten voor onze fauna opgegeven, doch zonder vermelding der namen. Daar mij echter vier soorten als inlandsch bekend zijn, geef ik er hier een overzicht van, met de mij bekende vindplaatsen.

Tiphia morio F. Van deze soort ving ik 4-5-1919 een ♂ bij Ede (G.). Het diertje vloog op een dorre, zandige heide. MAURISSEN vermeldt in zijn lijst van insecten, alleen in Limburg waargenomen (Tijdschr. v. Entom. deel XXV (1881), pag. CXIV), deze soort van Venlo (v. d. Br.).

SCHMIEDEKNECHT (Die Hym. Mitteleurspas, pag. 332) deelt omtrent deze soort het volgende mede. „Die Art ist selten und findet sich mehr im Süden. Ich fing sie vor Jahren bei Gumperda in Thüringen; weitere sichere Fundorte aus Deutschland sind mir nicht bekannt. Die Flugzeit war ganz auffallend, denn die Tiere flogen bereits Mitte März auf Sandboden".

Merkwaardig is, dat ik mijn exemplaar bijna onder dezelfde omstandigheden ving.

Tiphia femorata F. gewoon in de zandstreken.

Tiphia ruficornis LEP. 1 ♂ Vorden, 8-8-1919 Deze soort heb ik nog niet vermeld gevonden.

Tiphia minuta LIND. Driebergen (SIX.); Haagsche bosch (v. V.); 1 ♂ Valkenburg, Juni 1918, (A. J. ZÖLLNER); 1 ♂ Schiedam, 4-7-1919 (LINDEMANS).

Bij het doorzien van bovengenoemde lijst van MAURISSEN, vond ik *Trigonalys Hahnii* SPIN. als inlandsch, Venlo (v. d. Br.) vermeld. Deze soort werd dus door mij in deel 61 (1918) v. h. Tijdschr. v. Entom., Verslag pag. XXVIII foutief als nieuw voor onze fauna opgegeven.

Het geslacht *Trigonalys* werd ook niet door Dr. J. TH. OUDEMANS, De Nederlandsche Insecten, onder de inlandsche genera vermeld.

Rotterdam, November 1919. J. LINDEMANS.

Rupsenbeschrijvingen V.

5. Hadena porphyrea Esp.

Volwassen rups. Forsche Noctuïden-rups, in de jeugd groen, na de laatste vervelling vuilbruin met honigbruinen kop; achterwaarts iets dikker wordend. Lengte ongeveer 4 cM.,

Nadere omschrijving. Kop honigbruin; halsschild weinig ontwikkeld, groenachtig bruin. Lichaam van boven vuilbruin, met een roseachtig tintje in die kleur, van onderen