

enkele vroeg verpoppte rupsen nog in denzelfden zomer uitkomen. Zelf heb ik dat nog nimmer waargenomen, althans bij voorwerpen, die als volwassen rups, of als pop in de vrije natuur verzameld werden. Dat het bij eene kweekerij uit het ei voorkomt, is mij wèl bekend; ik bezit o.a. een manlijk exemplaar, nog afkomstig uit de collectie G. W. GREBNER, op welks etiket nauwkeurig vermeld staat, dat het ei gelegd werd 14 Mei, dat daaruit de rups kwam op 22 Mei, dat deze verpoppte op 28 Juni en dat de vlinder verscheen op 29 Juli, alles in het jaar 1863. Daar het een zeer gewoon verschijnsel is, dat in gevangenschap de tijd voor de metamorphose soms korter is dan in de vrije natuur, zegt het bovenstaande niet veel meer dan dat eene tweede generatie mogelijk is. Mochten er onder de lezers der Ent. Ber. zijn, die eene tweede generatie dezer soorten in de vrije natuur hebben waargenomen, m.a.w. den vlinder aldaar wel eens in den nazomer, of den herfst waargenomen hebben, dan ware het niet ongewenscht, dat mede te deelen.

Het vinden van late rupsen zegt niets¹⁾; de laat uitgekomen vlinders uit overwinterde poppen zullen ook late rupsen leveren; later dan Juli zullen als pop overwinterde vlinders echter stellig wel niet uitkomen. Vindt men dus vlinders in Augustus of September, dan heeft men alle kans eene tweede generatie voor zich te zien.

Kweekproeven, geheel in de vrije natuur genomen, zouden uitsluitsel kunnen geven.

Putten.

J. TH. OUDEMANS.

**Uit Duitsche vlinderpoppen gekweekte sluipwespen,
behoorende tot de groep der Lissonotini;
Meniscus nonagriae n. sp.**

Uit poppen van *Gortyna ochracea* HBN. en *Acronycta abscondita* TR., in de omgeving van Berlijn verzameld, ontwikkelde zich in mijn laboratorium de sluipwesp *Echthrodoca conflagrata* GRV., uit die van eerstgenoemde vlindersoort bovendien in een drietal exemplaren de zeldzame *Anarthronota thuringiaca*

¹⁾ Tenzij deze nog in hetzelfde jaar den vlinder leveren en deze onder natuurlijke omstandigheden na het vinden geleefd hebben.

SCHMIED.; beide sluipwespsoorten zijn ook in Nederland inheemsch.

Uit poppen van *Nonagria geminipuncta* HATCHETT, mij uit Raguhn (Anhalt) toegezonden, kwamen 2 ♀♀ eener nog onbeschreven soort van het genus *Meniscus* te voorschijn. Hier volgt eene korte beschrijving dezer nieuwe soort, welke ik *Meniscus nonagriae* nov. spec. noem.

Kop en thorax gelijkmatig, zeer fijn en dicht bestippeld; alleen het metanotum vertoont in het midden grovere sculptuur. Kop achter de oogen rondachtig versmald; voorhoofd in het midden overlansg diep uitgehold en de binnenoogranden ietwat gezwollen. Sprieten dun. Voorvleugel met aan de bovenhelft verdikten nervus basalis; nervus basalis en nervus discocubitalis divergeerend; areola gesteeld. Nervellus onder het midden gebroken. Achterlijf fijn lederachtig; het eerste segment aan de basis uitgehold. Pooten gewoon; klauwen gekamd.

Lichaamslengte 13 mM.; lengte der legboor, van boven gezien, 15 mM.

Kop en thorax zwart. Orbitae faciales min of meer duidelijk wit gerand; clypeus, de tophelft der kaken en de palpen bruinrood; sprieten donkerbruin. Thorax met witte, driehoekige schoudervlekken; tegulae donkerbruin; vleugelwortels geelachtig. Vleugels met eene min of meer duidelijke, bruine vlek in de discocubitaal- en de discoïdaalcel; vleugeladeren en stigma donkerbruin, vandaar de fenestrae der beide terugloopende aderen en die der buitenader van de areola opvallend helder. Achterlijf rood met zwarte basis; segment 7 met zeer fijnen, zwartachtigen achterrand. Heupen rood, donker gevlekt; trochanters zwart; dijen rood; die der achterpooten donkerbruin.

Verder kweekte ik uit eene niet nader te preciseeren *Nonagria*, welke *Typha latifolia* L. bewoont (*Typha latifolia* wordt door drie verschillende *Nonagria*-soorten aangetast) en uit dezelfde streek van Duitschland afkomstig was als voor-noemde *Meniscus nonagriae*, 2 ♀♀ van *Meniscus scapularis* KRIECHB., eene sluipwespsoort, welke, naar het schijnt, tot nu toe slechts in Zuid-Hongarije waargenomen is.

Ginneken, 5 Maart 1920.

L. A. L. SMITS VAN BURGST.