

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XXVIII.

98. *Bembidion atrovioleaceum* DUFOR, welke moet heeten: *stomoides* DEJ. (? *atrovioleaceum* DUF., ? *basale* MOTSCH.) (zie Ent. Bericht, No. 86, 1 Nov. 1915) is nu toch uit Nederland bekend geworden. Dr. MAC GILLAVRY ving bij Bunde, nabij Maastricht, Juni, een ♀, dat met mijn dank voor mijne collectie bestemd werd.

582. *Atemeles emarginatus* PAYK. De *a. nigricollis* KRAATZ werd door Pater WASMANN bij Exaeten (Limburg) gevangen. Bij Valkenburg zijn eenige exemplaren gevangen met wat donker getint halsschild, maar deze zijn door Pater WASMANN niet tot deze ab. gebracht; zij zijn ook niet zoo diep zwart als de typische *nigricollis*.

1053^{bis}. *Ancyrophorus longipennis* FAIRM. et LAB. (♀ *prae-positus* MULS. REY) is door Dr. MAC GILLAVRY bij Bunde (Limb.), Juni, gevangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan.

1119^{ter} *Euplectus Erichsoni* AUBÉ. Door FR. RÜSCHKAMP S. J. bij Valkenburg (Limb.), Maart, gevangen en met mijn dank voor mijne collectie aangeboden.

1558. *Anommatus duodecimstriatus* MÜLL. en 1559. *basalis* REITT. zouden thans moeten heeten: *Reitteri* GANGLB. (= *12-striatus* REITT. olim) en *duodecimstriatus* MÜLL. (= *basalis* REITT.). Eerstgenoemde is uitsluitend bij Leiden, de tweede soort bij Zierikzee en Valkenburg gevangen. Bij *A. Reitteri* GANGLB., welke gemiddeld iets grooter is, vertoont o. a. het halsschild een duidelijken, meer of minder scherp aangeduiden basaalkant, ten gevolge van eene fijne dwarsgroef tegen den achterrand aan; bij *A. 12-striatus* MÜLL. ontbreken èn de basaalkant èn de fijne dwarsgroef tegen den achterrand van het halsschild.

1651. *Coccinella bipunctata* L. De *a. Olivieri* WEISE is bij Eethen (N. Brab.) gevangen. Bij een exemplaar uit Rotterdam is, evenals bij *a. lunigera* WEISE, de schoudervlek halvemaanvormig; de vlek aan den naad zeer klein, maar, evenals bij *a. 6-pustulata* L., met eene vrij groote topvlek, die met een fijnen randzoom met de schoudervlek samenhangt; ik noem

deze, naar den ontdekker, wijlen den bekenden Lepidopteroloog P. C. T. SNELLEN: *Suelleui* **nov. ab.**

Bij een exemplaar uit Meerssen (Limb.), dat het naast aan de *a. subluuata* WEISE verwant is, is de schoudervlek tot op de halve breedte van de basis, haakvormig omgebogen; overigens zijn de dekschilden geheel zwart, behalve de fijne naadrand, die zich achter het schildje tot een langsstreepje verbreedt en daarnaast een licht vlekje; ik noem deze, naar den ontdekker, den heer K. KEMPERS: *Kempersi* **nov. ab.**

Eene bijzondere kleurafwijking, die eenigszins den indruk maakt, wellicht eene zelfstandige soort te zijn en ook aan de in Lapland voorkomende *Adalia frigida* SCHNEIDER verwant is, ontving ik voor een aantal jaren van Dr. DAMMERMAN uit Arnhem, waarom ik die: *Dammermanui* **nov. ab.** noem. De gedaante is iets langer-eivond; de kop met twee gele vlekken; het halsschild zwart, aan weerszijden met eene groote, onregelmatige, tot aan de achterhoeken reikende, gele vlek, waarin eene groote zwarte vlek ingesloten is (zooals bij *C. conglobata* L. *a. inpustulata* L. veelal het geval is); dekschilden geelrood, elk met 4 zwarte vlekken, nl. eene groote, vooraan in het midden, welke naar binnen breeder, naar buiten smaller, tot op de schouderbuil loopt; eene tweede, als een breeden onregelmatigen dwarsband, in het midden, welke tot aan den zijrand, maar niet tot aan den naad reikt; dan nog twee kleine zwarte vlekken daarachter.

Dat deze ab. tot *Adalia bipunctata* L. en niet tot *10-punctata* L. (*variabilis* F.) gerekend moet worden, bewijzen de van een grooten breeden basaaltand voorziene klauwen en de halfcirkelvormige dijlijn, welke slechts tot op $\frac{2}{3}$ der lengte van het eerste sterniet reikt; bovendien is het bijlvormige eindlid der kaaktasters geelbruin met zwarten topvand.

1806. *Cercyon litoralis* GYLL. Exemplaren met lichtgele dekschilden met een zwart vlekje naar het uiteinde, zijn: *a. normannus* v. BENICK; ik bezit een paar exemplaren uit Zandvoort (zie: Col. Neerl. I. 652).

1862. *Ochthebius riparius* ILLIG. (*pygmaeus* GYLL., *impressus* BEDEL.) moet heeten: *impressus* MRSH. (*pygmaeus* PAYK., *riparius* ILLIG.). Exemplaren met bruingele dekschilden zijn *a. lutescens* KUW.; met het type. Het uit Wageningen

vermelde, dof geelbruine exemplaar, met donkeren kop, donker midden van het halsschild en met eene, van voren uitgezakte, donkere rugvlek, noem ik: *rufopacus* **nov. ab.** (zie: Col. Neerl. I. 663).

1878. *Trox hispidus* PONTOPP. Volgens O. SCHNEIDER vertoonen alle exemplaren van het Duitsche eiland Borkum de niet verhevene tusschenruimten op de dekschilden veel sterker gekorrelt dan bij de Fransche, Oostenrijksche en zelfs bij de iets gegranuleerde Caucasische exemplaren zijner collectie; wellicht behooren deze, meende hij, tot de aan hem onbekende v. *nodulosus* HAROLD; is zulks niet het geval dan wil hij deze ab. *insularis* noemen. De 4, in mijne collectie aanwezige exemplaren uit Nederland (Bosch- en Duin (Utr.), Apeldoorn, Arnhem en Bemelen (Limb.)), vergeleken met Oostenrijksche exemplaren, bevestigen wat O. SCHNEIDER vermeldt; deze moet dus heeten: a. *insularis* O. SCHNEIDER, niet *nodulosus* HAROLD, welke ik uit Corsica van den heer D. VAN DER HOOP bezit en eene andere variëteit blijkt te zijn.

1949. *Rhizotrogus solstitialis* L. De var. *ochracens* KNOCH (? *limbatipennis* VILLA, *Maldenesi* CHEVROL., *tropicus* DUF.) werd bij Well in Limburg, Juni, gevangen. Door de vriendelijkheid van Dr. A. WILLEMSE ontving ik een ♂.

2612. *Aphthona pygmaea* KUTSCH. Een exemplaar werd, door Dr. D. MAC GILLAVRY, bij Valkenburg (Limb.), Juni, gevangen en met mijn dank voor mijne collectie bestemd.

3103^{bis}. *Apion corniculatum* GERM. Ik ontving met dank een exemplaar uit Blijenbeek (Limb.), Mei, door de vriendelijkheid van Pater WASMANN en FR. RÜSCHKAMP.

3204^{bis} *Tomicus typographus* L. Van Pater WILFR. RISWICK ontving ik een beschadigd, onuitgekleurd exemplaar, met de etiket: Eindhoven, 15.8.18. Ik vermoed, dat dit, evenals zulks met de soorten: *T. acuminatus* GYLH., *T. curvidens* GERM. en *Pityogenes chalcographus* L. het geval was, uit een ingevoerde heipaal verkregen is. Van een werkelijke standplaats in Nederland is mij nog steeds niets bekend geworden. Het exemplaar werd met mijn dank voor mijne collectie bestemd, maar voorloopig als een „verdwaalde” soort gemerkt.