

Amersfoort. Ongeveer op de hoogte van het kamp Nieuw-Milligen was de weg over eene lengte van circa 4 K.M. letterlijk met mestkevers bezaaid. Op de hoopjes paardemest zaten ze bij tientallen. Aan den kant van den weg en in het eikenhakhout waren er bijna geen te zien. Buiten het beschreven gebied werden, hoewel daar paardemest aanwezig was, geen mestkevers aangetroffen".

De verklaring van deze mestkever-massa is, volgens mijn neef, Dr. J. TH. OUDEMANS, de volgende.

Aan den straatweg Amersfoort—Apeldoorn bij Nieuw-Milligen, waar de jongelui de kevers aantreffen, ligt het „Remonte-Depot", een heel complex van gebouwen, dienende om de paarden voor het Nederlandsche leger op te fokken. Daar verblijven groote hoeveelheden paarden. In hun mest kunnen honderdduizenden mesttorren zich ontwikkelen. Op den bewusten dag zijn die aan het vliegen gegaan en op de versehe mest op den straatweg neergestreken.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Acarologische Aanteekeningen LXV.

Dr. G. ROMIJN te 's-Hertogenbosch stelde mij herhaalde malen in de gelegenheid, zijne mikroskopische preparaten van *Acari*, die hij bij zijn hydrobiologische onderzoekingen machtig worden kon, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Onder het materiaal, door hem verzameld, bevinden zich een aantal *Acari*, die niet tot de *Hydrachnidae* behooren, waarvan Dr. ROMIJN uit den aard der zaak eene speciale studie maakt. Diegene, waarvan de vindplaats nauwkeurig bekend is, mogen hier eene vermelding vinden.

Parasitidae.

Veigaia planicola BERLESE ♂. Gulp bij Gulpen, 26-VII-1918.

Hypoaspis necornigor OUDEMANS. Nph. III, ♂♂, ♀♀. Gulp bij Gulpen, 27-VIII-1919.

Bdellidae.

Tetranychus ununguis JAC. ♀. Op een bladwesplarve (verdwaald) van *Verbascum*, 's-Hertogenbosch. 10-VI-1918. **Faun. nov. sp.**

Stigmaeus sp., aan *S. clavatus* CAN. & FANZ. verwant,

vermoedelijk eene nov. sp. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918, verbrijzeld. **Faun. nov. spec.**

Stigmaeus sp., vermoedelijk *S. kermesinus* C. L. KOCH, spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918, verbrijzeld.

Stigmaeus kermesinus K. L. KOCH, Oostelijke heideplas bij Assel, Veluwe, 12-III-1919.

Oribatidae.

Oribata riparius NIC., verbrijzeld, spreng op „de Oorsprong”, Oosterbeek, 21-XII-1918. **Faun. nov. sp.**

Hypochthonius sp., vermoedelijk eene nov. sp. 's-Heerenven bij Bostel, 6-III-1919. **Faun. nov. spec.**

Eremaeus sp., vermoedelijk eene nov. spec. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918. **Faun. nov. spec.**

? *Xenillus*, brokstuk. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918.

Xenillus sp., één verbrijzeld en één immatuur, doch ietwat platgedrukt exemplaar. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918. **Faun. nov. spec.**

Xenillus sp. Plas te Nuland, 31-III-1919. **Faun. nov. spec.**

Murcia trimaculata C. L. KOCH. Spreng te Beekhuizen, 22-X-1918.

Phthiracarus italicum OUDMS. 5 ex. Beekje te Geule, Limb., 13-IX-1918.

Helaas ontbreekt mij de tijd, na te gaan, of de vermoedelijk novae species werkelijk nieuw zijn, en ze dan te beschrijven.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Pristiphora fausta Htg. (Hym.).

Over deze even fraaie als zeldzame bladwesp heb ik het een en ander in de Ent. Ber. van 1 Juli 1919, No. 108, Dl. V, p. 155, medegedeeld. Als vervolg daarop kan ik thans het onderstaande daaraan toevoegen.

De parthenogenetische larven, die zich einde Mei en begin Juni 1919 insponnen, leverden de imagines in de laatste dagen van April 1920. Dat geschiedde binnenshuis en zou in de vrije natuur allicht een paar weken later het geval geweest zijn. In elk geval blijkt er uit, dat slechts ééne generatie per jaar geproduceerd wordt.

Zooals te verwachten was van eene soort, die in de natuur