

Literatuur.

1. P. MÉGNIN. Mémoire sur l'organisation et la distribution zoologique des Gamasidés. In: Journ. Anat. Physiol. 1876.
2. A. MURRAY. Economic Entomology, Aptera. London, 1877.
3. A. BERLESE. Acarorum Systematis specimen. In: Bull. Soc. Ent. Ital. 1884.
4. E. L. TROUESSART. Considérations générales sur la classification des Acariens suivies d'un essai de classification nouvelle. In: Rev. Sci. Nat. Ouest. 1892.
5. A. C. OUDEMANS. Acarologische Aanteekeningen XXIII. In: Ent. Ber. v. 2, n. 29, p. 81. 1 Mei 1906.
6. A. C. OUDEMANS. Acarologische Aanteekeningen XXVI. In: Ent. Ber. v. 2, n. 47, p. 319. 1 Mei 1909.
7. A. C. OUDEMANS. A short survey of the more important families of Acari. In: Bull. Ent. Research. v. 1. 30 Juli 1910.
8. A. C. OUDEMANS. Notizen über Acari, 25. Reihe. In: Arch. Nat. v. 82, A. 6, p. 16.sqq. Dec. 1917.
9. STANLEY HIRST. Studies on Acari. No. 1. The Genus *Demodex*, Owen.; Brit. Mus. (Nat. Hist.). London 1919.
10. A. C. OUDEMANS. Das Dollosche Gesetz der Irreversibilität. (Verschijnt binnen kort in het Archiv. f. Naturgeschichte).
11. A. C. OUDEMANS. Nieuwe Classificatie der Acari. In: Ent. Ber. v. 2, n. 27, p. 43—46. 2 Jan. 1906.
12. A. C. OUDEMANS. Das Tracheensystem der Labidostomidae und eine neue Klassification der Acari. In: Zool. Anz. v. 29, n. 20, p. 633—637. 8 Jan. 1906.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Corrigenda.

In Entomol. Berichten, Deel V, No. 109, 1 Sept. 1919, staat op blz. 173, regel 3 v. o.: *ruficollis*; lees: *rugicollis*.

In idem No. 117, 1 Jan. 1921, staat op blz. 304, bij 1206. *Necrophorus vespillo*: „met iets gekromde voorschenen”; lees: achter schenen.

Ibidem, blz. 305, bij 1796. *Limnebius truncatelles*, lees: *truncatellus*.

Ibidem, blz. 308, bij 2758. *Polydrosus chrysomela* OLIV., staat bij de synoniemen: *salicicola*; dit moet zijn: *salsicola*; zoo ook op blz. 309, regel 19 v. o., bij *Eustolus chrysomela* OLIV. = *salsicola*.

Den Haag.

ED. EVERTS.

Neue europäische Aphiochaeta-Arten IV.

(Phoridae, Dipt.).

1. *Aphiochaeta trichorrhoea* n. sp. ♂.

Sehr dunkle Art mit eigentümlich behaartem Hypopyg. — Stirn schwarz, mit schwachem Glanze. Senkborsten praktisch gleich; die obere nicht weiter voneinander entfernt als die inneren Borsten der Mittelreihe. Innere B. der 1. Querreihe den äussern stark genähert und auf demselben Niveau. — 3. Fühlerglied nicht vergrössert, schwarz; Arista deutlich pubeszent. — Taster dunkel, normal. — Thorax schwarz, Schildchen zweiborstig; Mesopleuren mit einigen gleichlangen Haaren. — Hinterleib schwarz, matt. Hypopyg nicht gross, schwarz mit schwachem, grauem Schimmer, beiderseits entlang dem untern Seitenrande mit einer grossen Anzahl (über 20) langer, dicht nebeneinander gestellter, an der Spitze stark einwärts gekrümmter Haare, die einen eigentümlichen Anblick gewähren. Analsegment kurz, dunkelfarbig. — Beine alle dunkel, aber die Vorderbeine an den Hüftspitzen und den Knieen, sowie die Vorderschienen und Vordertarsen hellbraun. Letztere nur schwach verdickt, sodass man im Zweifel sein kann, ob man die Art zu der Gruppe *dahli* BECKER oder *atripes* BRUES stellen soll. Hinterschenkel an der Basis nur mit gewöhnlichen Haaren. Hinterschienen mit etwa 12 schwachen und dünnen Wimpern, von denen nur die mittleren etwas deutlicher hervortreten. — Flügel etwas grau getrübt; Randader nicht ganz bis zur Mitte (0.48), lang gewimpert; Abschnitte wie 17 : 8 $\frac{1}{2}$: 6. Gabel nicht so steil wie bei *atripes* BRUES. 4. Längsader nur mässig gebogen, mit undeutlichem Ursprung an der Gabel. — Schwinger schwarz. — Länge 1.2 mm.