

Biegung. Vierte Längsader gleichmässig und schwach gebogen, ohne Cirkumflexkrümmung an der Wurzel und ohne Rückwärtsbiegung am Rande. — Schwinger gelb, etwas braun verdunkelt. — Länge  $1\frac{1}{2}$  mm. — Fundort: Feldkirch, Vorarlberg 1 ♂ 12. VIII. 1920 in meiner Sammlung.

Anmerkung. *A. longipalpis* WOOD ving ich zweimal in Holl. Limburg und am 18. VIII. 1920 auch in Feldkirch. WOOD hat bei ihr wie in andern Fällen die untern Senkborsten übersehen. Die Art scheint auch etwas te variieren. Die Taster können mehr braun als schwarz, die Beine mehr gelbbraun als schwarzbraun gefärbt sein. Das Feldkircher ♂ hat 4 Borsten jederseits am Hypopyg, 3 am untern Rande, die 4. etwas höher.

Bonn a. Rh. 26. XI. 1920.

H. SCHMITZ S. J.

### Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopterenfauna XXXIII.

120. *Ocys quinquestriatus* GYLL. Van Pater F. RÜSCHKAMP S. J. ontving ik, met mijn dank, een dwergexemplaar van slechts  $3\frac{1}{2}$  mm. lengte.

139. *Laemostenus terricola* HERBST. Uit Nassau wordt eene var. *lithmanicus* MOTSCH. vermeld, welke kleiner dan het type is, met rechte middelschenen. Een dergelijk exemplaar, slechts 13 mm. lang, ontving ik in 1905, van Dr. DAMMERMAN, uit Arnhem.

452<sup>bis</sup>. *Gyrinus striolatus* FOWL., zie: Ent. Ber. Deel V, No. 107, 1 Mei 1919, bij *Gyrinus colymbus* ER. Van *G. striolatus* FOWL ontving ik, met mijn dank, een exemplaar, met de etiket: Exaeten 1901 (ex. coll. WASMANN), van Pater F. RÜSCHKAMP S. J.

491<sup>bis</sup>. *Oxypoda humidula* KR., GANGLB. (*umbrata* ER.), welke, volgens BERNHAUER, *vicina* KR. (*soror* KR., *humidula* KR., *umbrata* ER.) moet heeten, zeeft ik, bij Spaubeek (L.), Juni, in één enkel exemplaar, uit dorre bladen.

912<sup>bis</sup>. *Medon apicalis* KR. (zie: Ent. Ber. No. 117, 1 Jan. 1921). Deze soort is het naast aan *ripicola* KR. verwant. Terwijl bij deze soort de kop groot en breed, opvallend breeder dan het halsschild en ook breeder dan de dekschilden

is, is de kop bij *apicalis* even breed als het halsschild en, evenals dit, duidelijk smaller dan de dekschilden. In de tabel, Col. Neerl. I, 308, zou de beschrijving bij 2 aldus tusschengevoegd moeten worden en zou bij 1, eerste alinea, iets toegevoegd moeten worden:

1. De slapen stooten op de onderzijde van den kop nagenoeg tegen elkaar aan<sup>1)</sup>, of zijn door eene zeer smalle tusschenruimte gescheiden. Bovenzijde iets glanzig. Het uiteinde van het mesosternum meestal fijn gekield enz. . . . . 2  
De slapen enz. . . . . 7
2. Het uiteinde van het mesosternum met eene fijne, korte langskiel. De slapen stooten op de onderzijde nagenoeg tegen elkaar aan. Zie verder, in de tabel, bij 2, eerste en tweede alinea.

Het uiteinde van het mesosternum niet gekield. De slapen op de onderzijde van den kop door eene zeer smalle, fijn gechagrineerde tusschenruimte gescheiden. Bovenzijde roodbruin, de kop en de buitentophoek, of nagenoeg het uiteinde, der dekschilden bruin of zwartachtig. Kop uiterst fijn en uiterst dicht bestippeld. Halsschild zwak glanzig, zeer fijn en zeer dicht bestippeld, hoogstens met eene zwakke aanduiding van eene gladde middellijn. Dekschilden veel langer dan het halsschild, zeer fijn en zeer dicht-, het achterlijf uiterst fijn en uiterst dicht bestippeld. Lengte  $3\frac{2}{5}$  mm. . . . *apicalis* KR. 1186<sup>quater</sup>. *Colon fusculum* ER. Pater F. RÜSCHKAMP S. J. ving in Valkenbnrg (L.), Juni, een ♀, dat tegen een venster aangevlogen was. Het exemplaar werd, met mijn dank, voor mijne collectie bestemd.

Den Haag.

ED. EVERTS.

### Adreswijziging.

Dr. A. C. OUDEMANS is verhuisd van Markt 1, Arnhem, naar **Burgemeester Weertsstraat 65**, Arnhem.

<sup>1)</sup> Dat zijn, in andere termen uitgedrukt, de aaneenstootende keel-naden.