

Merkwaardige kleuraberratie van *Cicindela silvatica* L.

In het Leuvenumsche bosch vond ik een exemplaar van *Cicindela silvatica* L. ♂, waarbij de witte teekening op de dekschilden bijna ontbreekt. Het exemplaar is zorgvuldig ontvet, zoodat de teekening niet door vervetting onzichtbaar geworden is. Van de humeraallunula zijn slechts twee uiterst kleine stipjes over, de dwarsband achter het midden is geheel verdwenen, terwijl zich vóór het uiteinde nog een zeer klein, nauwelijks zichtbaar wit stipje bevindt. Het exemplaar wordt door mij afgestaan voor de collectie van Dr. EVERTS.

Rotterdam.

D. L. UIJTENBOOGAART.

Merkwaardige Coleoptera te Rotterdam gevonden.

In Juli l.l. werd ik gewaarschuwd, dat een oud pakhuisje, gelijkvloers gelegen, ontruimd werd, omdat de vloer, uit gewone klinkers bestaande, overal verzakte. Gewapend met de keverzeef ging ik er heen, zeefde eerst een hoop afval van graan en van moscovische matten uit en liet daarna den vloer op eenige plaatsen opbreken. Zoodra hiermede begonnen werd kwamen muizen bij tientallen te voorschijn, die onder den vloer hunne nesten hadden. Deze nesten, vormlooze stroobundeltjes vol excrementen, waartusschen hier en daar een verdroogde muis, wemelden van mijten, vlooien en kleine gele kevertjes. Een flinke portie werd doorgezeefd; de twee zeefsels afzonderlijk gehouden en daarna met den photeklektor bewerkt. Mijten en vlooien zullen naderhand door Dr. A. C. OUDEMANS worden onderzocht; de coleoptera, waarvan enkele Dr. EVERTS veel hoofdbreken hebben gekost, bleken de volgende te zijn:

A. Uit den afval van graan en matten:

- 1 *Cryptophagus (Mnionomus) simplex* MILL. faun. nov. sp.
(tot nu toe slechts in enkele exemplaren uit Oostenrijk, Hongarije en misschien Hildesheim bekend) in aantal.
- 2 „ *pilosus* GYLII.
- 3 „ *cellaris* SCOP.
- 4 „ *acutangulus* GYLII.
- 5 „ *saginatus* ST.
- 6 „ *badius* ST.
- 7 „ *distinguendus* ST.
- 8 *Lacmophloeus pusillus* SCHÖNH.
- 9 „ sp.?
- 10 *Palorus depressus* F.

B. Uit de muizennesten:

- 1 *Xylodromus concinnus* MARSH.
- 2 *Carcinops 14-striata* STEPH.
- 3 *Monotoma testacea* MOTSCH. (*rufa* REDT.) faun. nov. sp.
5 ex.
- 4 „ *quadrifoveolata* AUBÉ faun. nov. sp. in aantal.

De beide laatste soorten staan in het algemeen als *zeer zeldzaam* te boek. Misschien zijn het echte inquilinen van de huismuis en zullen zij bij onderzoek van muizennesten meer gevonden worden.

Rotterdam.

D. L. UIJTENBOOGAART,

Iets over drie, in Nederland voorkomende, Bledius-soorten.

In den Catalog. Coleopt. Europ. etc., 1906, staat *Bl. terebrans* SCHÖDTE (Nat. Tidsskr. 1866—67, p. 149) uit Denemarken, als synoniem met *Bl. pallipes* GRAV. (ER.) opgegeven, wat onjuist blijkt te zijn. *Bl. terebrans* SCHÖDTE is eene