

volgens den heer BONDROIT, synoniem zijn de uit Schotland beschreven *Bl. seccernendus* JOY (Ent. Monthly Mag. 1911, Vol. XLVII, p. 269). Ik beschouwde *Bl. subniger* O. SCHNEID. als eene kleur-aberratie van *Bl. arenarius* PAYK., met bijna geheel zwarte dekschilden. Volgens BONDROIT bestaan er exemplaren van *Bl. subniger*, bij welke het geel op de dekschilden de overhand heeft, evenals er van *Bl. arenarius* exemplaren bekend zijn, waar de dekschilden bijna geheel zwart zijn.

De beschrijving der laatste twee soorten volgt in een 9<sup>e</sup> supplement-lijst op mijne Coleoptera Neerlandica.

De twee exemplaren van *Bledius dissimilis* ER. ab. c. *nigricans* ER., door Pater E. WASMANN van Exaeten in Limburg vermeld, zouden, volgens BONDROIT, tot het type behooren, terwijl de ware *Bl. nigricans* ER. (Gen. 769) van *dissimilis* zeer onderscheiden is en alleen uit Zuid-Rusland (ERICHSOHN) en Bosnië (synon. *simpliciventris* APFELB., in Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 638) bekend is.

Den Haag.

ED. EVERTS.

### Iets over *Philonthus thermarum* Aubé.

Bij GANGLBAUER, REITTER en andere Duitsche schrijvers over *Colcoptera*, wordt van deze soort vermeld: „in Gewächshäusern und in Lohbeeten. sehr selten.”

De soortnaam duidt op het voorkomen in eene omgeving met hooge temperatuur. Ik vond deze soort, als nieuw voor de Nederlandsche Fauna, in een komposthoop in den Haag-schen dierentuin, waar zij tusschen plantenafval, zoowel uit de warme kassen als ook uit den kouden grond, leeft. Vele exemplaren zaten hoofdzakelijk in een dikke laag weggeworpen verwelkte rozen uit het fraaie rosarium aldaar, welke flink aan het gisten was gegaan, waardoor een opvallend hooge

temperatuur waarneembaar was en een zeer intensieve rozengeur zich verspreidde; daar maakten die diertjes vermoedelijk jacht op de vele Acarinen.

In verband met de behoeften aan eene omgeving met hooge temperatuur, herinner ik mij, in 1878, bij een tocht op den Vesuvius, diezelfde soort in aantal waargenomen te hebben tusschen de heete asch en lapilli, die ik in een blikken bus medenam. Die kleine *Staphylinen* zullen, rondvliegende en door den wind medegevoerd, een schuilplaats gevonden hebben in de warme omgeving tusschen nog niet afgekoeld vulkanisch materiaal, waar voedsel wel niet te vinden is.

Den Haag.

ED. EVERTS.

---

### Een nieuwe kleur=verscheidenheid van *Panagaeus crux=major* L.

In Mei 1913 werd door den heer EMILE DERENNE (uit Boitsfort in België), tijdens een verblijf op Walcheren, bij Westkapelle eene, tot nog toe onbekende, kleur-afwijking van bovengenoemde soort ontdekt. Ik noem deze

#### a. *centromaculatus*

en geef daarbij de beschrijving als volgt:

Op elk der dekschilden zijn de twee groote, roode vlekken zoo volkomen met elkaar versmolten, dat van den, bij het type voorhanden, gemeenschappelijken zwarten dwarsband, slechts een klein vierhoekig middenvlekje over den naad is overgebleven.

Door de vrijgevigheid van den ontdekker, is dit merkwaardig exemplaar in mijn bezit gekomen.

Den Haag.

ED. EVERTS.

---