

## Een Vraag aangaande *Haltica oleracea*.

In de onlangs verschenen *Fauna Germanica*, Coleoptera, Deel IV (door REITTER) en nog in eene andere publicatie van den laatsten tijd wordt er beweerd, dat *Haltica oleracea* niet schadelijk zou zijn voor gekweekte kool. Wij zouden dus hier te doen hebben met een van die traditioneele dwalingen, die in alle leer- en schoolboeken voorkomen en van editie tot editie worden meêgesleept. Kan iemand omtrent deze kwestie iets uit eigen ondervinding mededeelen? Dat „aardvlooiën” op tuinkool, vooral naar het schijnt op bloemkool voorkomen en schade doen, staat natuurlijk vast. Ook vernam ik van onze eerste autoriteit in coleopteris, den heer Jhr. Dr. E. EVERTS, dat hij *H. oleracea* dikwerf op wildgroeijende *Brassica*-soorten, en wel *B. oleracea*, *Rapa* en *Napus* heeft waargenomen. De vraag betreft dus bepaald *H. oleracea* en de schade, die zij al of niet aan gekweekte kool veroorzaakt.

Sittard.

H. SCHMITZ S. J.

---

## Acarologische Aanteekeningen LI.

Wat is *Acarus coleoptratorum* L.?

Dat moeten we aan LINNÉ zelf vragen, niet aan latere auteurs! LINNÉ zegt ons in zijne *Systema Naturae*, Ed. X, 1758:

*Acarus coleoptratorum*. A. rufus, ano albicante. Fn. suec. 1198. — Blanck. ins. t. 14, f. H. — Frisch. ins. 4, t. 10. — Reaum. ins. 6, t. 4, f. 13—14. — Roes. ins. 4, p. 20, t. 1, f. 10—15. — Habitat in Scarabaeis.

Uit deze uiterst korte beschrijving kunnen wij niet veel leeren, daar er meer dan een *Acarus* is, op wie deze diagnose past. Gelukkig verwijst LINNÉ naar zijn eigen *Fauna suecica* en naar vroegere auteurs. In het laatstgenoemde werk worden nog LISTER en „Act. ups. 1736 geciteerd. Ik behandel al deze werken thans achtereenvolgens.

1678. LISTER. — LINNÉ citeert in zijn *Fauna suecica*