

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 78.

DEEL IV.

1 Juli 1914.

INHOUD: Dr. H. J. LYCKLAMA A NIJHOLT. *Nonagria dissoluta* Tr. var. *arundineta* Schmidt. — Dr. D. MAC GILLAVRY. Voorjaarsvangsten. — Dr. J. TH. OUDEMANS. Late hommels. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen LIV. — Dr. A. C. OUDEMANS. Aanteekeningen over *Suctoria* XXIV.

***Nonagria dissoluta* Tr. var. *arundineta* Schmidt.**

Deze op de meeste plaatsen van Nederland niet, en slechts op zeer enkele overvloedig voorkomende vlinder is bij de met riet begroeiide slooten nabij Domburg zeer gemeen. De rups heb ik niet meer kunnen vinden, evenmin als de pop, daar ik te laat in het jaar daar was; den vlinder ving ik eenige avonden bij tientallen bij het licht van eene acetyleenlantaarn.

Deze vlinder wisselt vrij sterk in uiterlijk, waarom eene beschrijving naar vele exemplaren mij wenschelijk voorkomt.

Tenger gebouwde vlinder; 26—30 mM. vlucht. Sprieten ongetand. Grondkleur van zwartgrijs tot stroogeel; somtijds iets roodachtig. Kop en halskraag meestal even donker en gelijk gekleurd als de voorvleugels, enkele malen iets donkerder; achterrand van den halskraag eene fijne, helderwitte streep vormend; over de voorvleugels eene donkere schaduw in de lengterichting, vanaf den wortel tot aan de niervlek of verder daaroverheen, zelfs tot over de franje; de onderzijde van deze schaduw is evenwijdig met den binnenrand. Onder den voorrand en evenwijdig daarmede eene slechts zelden duidelijke, somtijds geheel ontbrekende, dunne, donkere schaduw. Franjeveld steeds ietwat beschadwd.

Bij de lichte exemplaren zijn de schaduwen het duidelijkst; bij de zeer donkere bijna gelijk aan de grondkleur.

De eerste dwarslijn bestaat uit franjewaarts bolle boogjes, aan de binnenzijde telkens op de grens van twee boogjes zwarte streepjes. Deze streepjes zijn altijd zichtbaar, de dwarslijn slechts zelden duidelijk, en dan van den binnenrand tot ader 6, verder slechts bij zeer enkele exemplaren. De richting van de geheele dwarslijn is eene zeer flauw buitenwaarts gebogen lijn.

De tweede dwarslijn bestaat uit wortelwaarts bolle boogjes, met zwarte streepjes op de grens van twee boogjes aan de franjezijde; de streepjes zijn altijd zichtbaar, de boogjes meestal, somtijds zeer duidelijk. De richting van de tweede dwarslijn is met een grooten boog om de niervlek en vanaf ader 2 bijna loodrecht op den binnenrand.

Beide dwarslijnen zijn enkel en potloodgrijs.

Ronde vlek niet of even zichtbaar; duidelijk zijn meestal een wit puntje aan de onderzijde en twee zwarte puntjes aan de bovenzijde; bij duidelijk geteekende exemplaren blijkt het witte puntje het onderdeel der ronde vlek te zijn, de zwarte puntjes deel uit te maken van eene verder flauwgrijze omranding, met somtijds nog 2 kleine zwarte puntjes naast het witte.

Niervlek meestal geheel even zichtbaar. Grondkleur als de vleugels, of van de erover loopende schaduw, aan de onderzijde begrensd door twee witte stipjes, somtijds tot een boogje vereenigd, daaromheen afgebroken zwart geringd. Altijd zijn zichtbaar zwarte vlekjes aan de buitenzijde van de witte stipjes.

In het franjeveld de aderen meestal donker; de franjelijijn bestaat uit donkere lijntjes tusschen de aderen.

Achternvleugels iets lichter dan de voorvleugels, bij de donkere exemplaren effen, bij de lichte met donkerder achterrand en eene booglijn, welke somtijds uit zwarte streepjes in de richting der aderen bestaat.

Franje van voor- en achternvleugels als de grondkleur der voorvleugels.

Nijmegen.

H. J. LYCKLAMA A NIJEHOLT.