

<i>Boarmia lichenaria</i> HUFN., opgejaagd.	<i>Coscinia cribrum</i> L., serre.
<i>crepuscularia</i> HB., boomstammen.	<i>Hipocrita jacobaeae</i> L., rupsen.
<i>Thamnonoma zcauaria</i> L., serre.	<i>Nudaria mundana</i> L., schutting.
<i>Phasianc clathrata</i> L., opgejaagd.	<i>Lithosia griscola</i> HB., acet.
<i>Nola cutonalis</i> HB., acet.	» <i>complana</i> L., acet.
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> L., serre.	» <i>lutarella</i> L., overdag, rustend.
<i>Diacrisia sanio</i> L., overdag, opgejaagd; in 1892 talrijk.	<i>Pelosia muscerda</i> HUFN., acet.
Nijmegen.	<i>Zygaena filipendulae</i> L., overdag.
	<i>Ivo statices</i> L., overdag.
	<i>Hepialus sylvina</i> L., acet.
	H. J. LYCKLAMA à NIJHOLT.

### Verlaten mierenpaadjes.

Op verschillende boschpaden hier op Schovenhorst (Putten, G.), welke weinig beloopt worden, bevinden zich zoogenaamde mierenpaadjes, welke de boschpaden kruisen. Men kan ze reeds op eenigen afstand onderscheiden, daar de er steeds over loopende mieren vreemde voorwerpen, als humusdeelen enz., er zóoveel mogelijk van verwijderen en grootere omgaan, dus het paadje er naast maken. Het heeft er iets van, of iemand een ietwat kronkelende streep dwars over het pad getrokken heeft.

Nu is de regel, dat zulke paadjes door talrijke mieren beloopt worden, die in beide richtingen trekken. Op de zeer warme dagen, die dit jaar in de maand Juli voorkwamen, waren deze paadjes echter, gedurende de uren, dat zij door de zon beschenen werden, verlaten. Toen ik een nader onderzoek instelde, bleek mij, dat de mieren zich van beide zijden, dus van de boschranden van het pad, juist zoo ver waagden, als het paadje nog beschaduwde was. Zoodra zij op het door de zon beschenen gedeelte kwamen, keerden zij om. Zoodoende was het grootste gedeelte van het paadje geheel verlaten. Op zonnige dagen bij minder hooge temperatuur, heb ik dit verschijnsel nimmer waargenomen.

Putten.

J. TH. OUDEMANS.