

Inférieure, weigert hij dit voedel volkomen en gebruikt alleen aardwormen. Het zou zeker wel de moeite loonen om eens na te gaan, hoe het hiermede bij ons gesteld is.

Ook wordt uitvoerig aangetoond, hoe buitengewoon schadelijk de gewone huismusch voor den landbouw is en weerklinkt zijn roep: „Mort au moineau”. Deze meening moet ik volkomen met hem deelen.

Minder ben ik het met den schrijver eens, wanneer hij beweert, dat door hem het eerst eene methode is uitgevonden om rupsen in droogen toestand te prepareeren en dat hij voor het eerst de rups van *Hepialus lupulinus* beschrijft. Beide zijn wel reeds lang bekend.

Over het verhaal van de vrij naar beneden hangende poppen van *Vanessa cardui*, die zich de uiteinden met een draad aan elkander hadden gesponnen, toen zij ondervonden hadden hoe onaangenaam zij op een spoorreis door elkander waren geschud, zullen wij ons oordeel maar thuis houden. Zou ook een spin hier aan het werk kunnen geweest zijn?

Besluiten wij de korte aankondiging van dit toch wel aardige boekje met een aardig gezegde door schrijver gebruikt bij de bespreking van de vele onzinnige verhalen, die o. a. omtrent slangen, hagedissen, padden, enz., in omloop zijn: „Quand donc cesseront-ils (n.l. de landlieden) de penser que le critérium du vrai est l'invraisemblable”.

Den Haag.

H. J. VETH.

Coleoptera op de Excursie bij Weert verzameld.

<i>Carabus arvensis</i> HRBST.	<i>Stenus Rogeri</i> KR. spec. prop.
<i>Leïstus spinibarbis</i> F.	» <i>picipes</i> STEPH.
<i>Bembidion obliquum</i> ST.	<i>Cephennium thoracicum</i> MÜLL.
<i>Platynus gracilis</i> GYLH.	<i>Ptenidium nitidum</i> HEER.
<i>Aulonogyrus concinnus</i> KLUG.	<i>Ptiliolum Kunzei</i> HEER.
<i>Gyrinus minutus</i> F.	<i>Hister helluo</i> TRUQUI.
<i>Orectochilus villosus</i> MÜLL.	<i>Brachypterus fulvipes</i> ER.
<i>Atheta coriaria</i> KR.	<i>Antherophagus nigricornis</i> F.
<i>Othius melanocephalus</i> GRAV.	» <i>pallens</i> OLIV.

<i>Corticaria crenicollis</i> MNH.	<i>Anaspis thoracica</i> L. (<i>confusa</i> EMERY).
» <i>ferruginea</i> GYLH.	
<i>Syncalypta paleata</i> ER. Faun. nov. sp. ¹⁾	<i>Callidium violaceum</i> L.
<i>Limnichus sericeus</i> DFTS.	<i>Donacia vulgaris</i> ZSCHACH.
<i>Hoplia philanthus</i> FÜSSL.	<i>Cryptocephalus biguttatus</i> SCOP.
<i>Agilus viridis</i> L. en a. <i>linearis</i> PANZ.	<i>Phyllobrotica 4-maculata</i> L.
<i>Elater sanguineus</i> L.	<i>Galerucella grisescens</i> JOANN. (<i>sagittariae</i> WEISE) Faun. nov. sp.
<i>Corymbites quercus</i> GYLH.	<i>Caenopsis Waltoni</i> BOH.
<i>Campylus linearis</i> L.	<i>Bagous lutulosus</i> GYLH.
<i>Thelephorus rufus</i> L. en var. <i>lituratus</i> FALL., waaronder een bijna geheel zwart exemplaar.	<i>Gymnetron beccabungae</i> L.
Den Haag.	<i>Mouonychus punctum-album</i>
	<i>Tapinotus sellatus</i> F. [HRBST.
	ED. EVERTS.

De laatste dagen van Lathonia.

Onze vlinders overwinteren in alle stadia: de eene soort als ei, de andere als jonge rups, eene derde als volwassen rups, zeer vele als pop, enkele als imago.

Mij heeft het steeds veel belang ingeboezemd, onder welke omstandigheden de overwintering als volwassen insect plaats vindt. Dit in de vrije natuur na te gaan, valt niet mee, omdat de overwintering als imago in den regel zeer in het verborgene geschiedt. Zoodra ik hieromtrent een aantal gegevens verzameld heb, hoop ik er het een en ander over mede te deelen. Op het oogenblik wil ik slechts eene ontmoeting beschrijven, die met het zoeken naar overwinterende vlinders in verband staat.

Op 8 November 1914 speurde ik hier op Schovenhorst (Putten, G.) naar exemplaren *Gonapteryx (Rhodocera) rhamni* L., die de winterkwartieren hadden betrokken. Mijn oog viel op

¹⁾ Het is mij gebleken, dat alles wat tot nog toe in Nederland onder den naam van *Syncalypta setigera* ILL. gevangen is, verkeerd gedetermineerd is en *S. paleata* ER. moet heeten; eerstgenoemde is dus vervallen uit de Lijst. E.