

Dit laatste voorwerp is stellig niet tot *rufovenalis* te rekenen, eerder tot een ras van *Mucialla rufivena* HAMPS. (Moths of India, v. IV, p. 5). Van *Mucialla fuscolimbalis* vond ik twee ♂♂ van Java. SNELLEN zelf schreef l. c., dat hem het wijfje dezer soort niet bekend was. Nu heeft de heer KEUCHENIUS, die deze Pyraliden zelf gekweekt had, indertijd twee ♂♂ en een ♀ ter determineering opgestuurd. Na KEUCHENIUS' afbeeldingen en materiaal nauwkeurig met SNELLEN's typen vergeleken te hebben, kwam ik tot de ontdekking, dat onder den naam *fuscolimbalis* de ♂♂ beschreven waren van *rufovenalis*. Deze soort is sterk sexueel dimorph. De sexueele verschillen zijn door SNELLEN l. c. nauwkeurig aangegeven, zoodat de beschrijving daarvan hier overbodig is.

Leiden.

R. VAN EECKE.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna. ¹⁾

Carabus arvensis HERBST. Volgens H. v. LENGERKEN (*Carabus arvensis* HERBST und seine Rassen, in: Deuts. Ent. Zeits. 1911, p. 690) komen, van de door hem aangenomen rassen, twee in Nederland voor, n.l. het *Germaniae*-ras en het *silvaticus*-ras. Het eerste is zeer verbreid in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg; het tweede zag ik uit Gelderland, Noord-Brabant en vooral van het eiland Texel, waar dit ras niet zeldzaam is. In Groot-Brittannië (o. a. in de omstreken van London) leeft het *Anglicus*-ras. Later hoop ik hiervan een uitvoerig overzicht te geven.

Carabus monilis F. Van de var. *consitus* PANZ. ontving ik een fraai blauw-violet exemplaar uit Epen (Limburg) van den heer A. J. ZÖLLNER, welke kleurverscheidenheid mij nog maar alleen van het type bekend was.

¹⁾ Eene 9e Lijst van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche fauna, reeds sedert geruimen tijd gedrukt, is thans verschenen in het „Tijdschrift voor Entomologie”, 58e deel, 3e en 4e aflevering. De hierboven vermelde nieuwe soorten zijn sedert ontdekt geworden.

Notiophilus hypocrita PUTZ. (*laticollis* PETRI, REITT.). Deze soort is het naast verwant aan *palustris* DFTS., heeft eveneens roodachtige schenen, doch onderscheidt zich vooral, doordat de strook langs de zijden en de buitenste tusschenruimten der dekschilden uiterst fijn en dicht gechagrineerd is, terwijl bij *palustris* deze gedeelten glad en sterk glanzig zijn. Ik zag meerdere exemplaren uit de provinciën Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, uit 't Gooiland, alsook een enkel exemplaar uit Wijk-aan-Zee en Loosduinen. SCHILSKY vermeldt deze soort van het Deutsche Noordzee-eiland Borkum.

Dyschirius Neresheimeri HANS WAGNER (Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg I; in: Entomol. Mitteil., herausgeb. vom Vereine zur Förderung des Deutschen Entomol. Museums, Band IV, Nr. 7/9 20 Aug. 1915). Deze, eerst voor korten tijd, als nieuw beschrevene soort, uit de Pruisische provincie Brandenburg, werd, een paar jaren geleden, door de heeren Mrs. L. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL en C. VAN NIEVELT, bij Ommen in Overijssel, Mei, verzameld. Twee exemplaren, voor mijne collectie ontvangen, stonden aldaar onder den naam van *D. nitidus* SCHAUM. De beschrijving, door HANS WAGNER gegeven, past volkomen op onze exemplaren. Zij komt het meest overeen met *nitidus*, doch onderscheidt zich in hoofdzaak door de navolgende punten. Vooreerst de dichte, fijn gechagrineerde grondsculptuur op het naar voren afhellende basale gedeelte der dekschilden, wat bij *nitidus* spiegelglanzig glad is. Ook reikt de tweede stippellijn niet, zooals bij *nitidus*, tot de basale navelstip en is de eerste stippellijn aldaar wat dieper ingegroefd. Dan vertoont de derde tusschenruimte slechts 2 en niet 3 navelstippen, zooals bij *nitidus*; de voorste n.l. ontbreekt. De clypeus, welke bij *nitidus*, tusschen de beide zijtanden, gelijkmatig flauw concaaf is, is bij *Neresheimeri* in 't midden duidelijk naar voren gericht, zonder echter een bepaalden tand te vormen.

Dyschirius globosus HERBST. De ab.c. **ruficollis** KOLENATI (metallisch zwart, met bruinrood halsschild), welke nog niet als inlandsch bekend was (in de „Col. Neerl.” was het *

vergeten), is sedert door Dr. MAC GILLAVRY bij Zeeburg, April, gevangen.

Bembidion fluviatile DEJ. Bij het revideeren mijner *Bembidioni* vond ik onder eenige exemplaren van *B. ustulatum* L. (voorzien van de etiket Exaeten, 5.87, Maas), voor vele jaren van Pater E. WASMANN ontvangen, twee exemplaren van *fluviatile*, welke, reeds op het eerste gezicht, door de langgestrekte gedaante en het smalle, sterk gewelfde halsschild, onderscheiden zijn. Deze soort, welke langs den Maasoever in de prov. Limburg voorkomt, is overigens meer uit Zuidelijk Middel-Europa bekend, o. a. uit de omstreken van Parijs, langs de Seine.

Agathidium varians BECK. In aantal bij Velp, Juli en Aug. (Mr. L. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL).

Van Dr. A. C. OUDEMANS ontving ik een exemplaar van *Carabus catenulatus* SCOPOLI, bij Emmerik gevangen, dat als een voorbeeld van melanisme moet beschouwd worden; de kleur van het geheele lichaam is n.l. anthracietzwart, met uiterst geringe sporen van bronsschijn langs de zijden van halsschild en dekschilden. Volgens SOKOLÁR^v en HUBENTHAL zou deze soort *problematicus* moeten heeten, aangezien de naam *catenulatus*, door SCOPOLI, aan de later door PANZER als *catenatus* beschrevene soort uit Croatië en omliggend gebied zou gegeven zijn; volgens PAUL BORN, die niet zeker weet, waar de nominaatvorm eigenlijk thuis behoort, zou *C. catenulatus* SCOP. op het in Krain voorkomende ras beschreven zijn.

Bembidion atroviolaceum DUFOR (*stomoides* DEJ., *rufipes* var. JACQ. DUVAL), welke, volgens GANGLBAUER en REITTER, *stomoides* DEJ. moet heeten is, naar alle waarschijnlijkheid, niet uit Nederland bekend en zou alsdan uit de „Lijst” moeten vervallen.

Mijne exemplaren, uit Limburg, blijken tot *B. Millerianum* VON HEIJD. (*basale* MILL.) te behooren, zoo ook exemplaren die ik, voor vele jaren, uit Hildesheim van Dr. K. JORDAN ontving; goed gedetermineerde exemplaren daarentegen bezit ik van REITTER uit Hongarije en uit de Pyreneeën (Cauterets),

door mij zelven aldaar verzameld. Bij *Millerianum* zijn o. a. kenmerkend de, als stompe hoeken, duidelijk uitstekende schouders, d. w. z. dat in het verlengde van de 5^e stippellijn op de dekschilden, een hoekig uitsteeksel aan den schouder zichtbaar is, terwijl bij *atroviolaceum* de schouders volkomen afgerond zijn.

V r a g e n e n w e n s c h e n .

Komt *Carabus coriaceus* L. voor in den „Achterhoek” van Gelderland (Winterswijk, enz.) en noordelijker in het IJsselgebied dan om Deventer, alsmede in Noord-Brabant? Zij zou in het Mastbosch bij Breda en in Friesland bij Wolvega gevangen zijn, ik heb daarvan echter geen zekerheid.

Is *Bembidion ephippium* MRSH. nog elders dan langs de Zeeuwsche stroomen gevangen?

Gewenscht uit Nederland, zoo deze bij ons mochten gevonden zijn:

1. *Notiophilus 4-punctatus* DEJ. Nazien of deze wellicht onder de seriën van *N. biguttatus* F. schuilt; het meest waarschijnlijk uit Noord-Brabant en Limburg.
2. Groenachtige exemplaren van *Carabus nemoralis* MÜLL.
3. Fraai groene exemplaren van *Carabus cancellatus* ILLIG. Exemplaren van deze soort uit Noord-Brabant en Limburg, daar wellicht het, nog niet bij ons gevonden, *simulator*-ras daarbij kan zijn.
4. Zwartachtige exemplaren van *Carabus nitens* L.
5. Paarskleurige exemplaren van *Carabus arvensis* HERBST.
6. Exemplaren met geheel of gedeeltelijk blauwe dekschilden van *Bembidion velox* L.
7. Zwartachtige exemplaren van *Bembidion striatum* F.
8. Blauwzwarte en zwarte exemplaren van *Bembidion bipunctatum* L. Ook de a. *sexpunctatum* HEER (met 3, in de plaats van 2 diepe stippen op de 3^e tusschenruimte der dekschilden).
9. Ongevlekte exemplaren van *Bembidion obliquum* ST.

Den Haag.

Jhr. Dr. ED. EVERTS.