

Biologie. Ik kweekte een aantal rupsen uit het ei en voedde deze met *Chenopodium album*.

Putten.

J. TH. OUDEMANS.

Nog iets over *Stenopelmus rufinasus* Gyll.

(= *Degorsia Champenoisi* BEDEL)

(Fam. *Curculionidae*, Tribus *Bagoini*).

In het Tijdschrift voor Entomologie, deel 58, Verslagen, p. XXXVII, deelde ik reeds mede, dat dit kevertje met *Asolla* uit Amerika in Frankrijk (Charente Inférieure en in de buurt van Montpellier) is ingevoerd. Het leeft (volgens BEDEL; in: Bull. Soc. Ent. Fr. 73, 1904) aan de onderzijde der op de oppervlakte van het water drijvende plantjes, geheel ondergedompeld (evenals *Bagous* en sommige *Phytobius*-soorten); hetzelfde geldt ook voor de larve, die door eene langwerpige, dichte, zwarte, aan de onderzijde der voedselplant bevestigde, korst omgeven is.

Het kevertje herinnert in habitus aan een zeer kleinen, kort gedrongen *Bagous*, ook wel aan een zeer kleinen *Phytobius*; wat de grootte betreft ($\pm 1\frac{4}{5}$ mm.) aan de grootste exemplaren van *Tanysphyrus lemnae* PAYK. De snuit is kort en dik, korter dan het halsschild, rood; de sprieten in het midden van den snuit ingeplant, de scapus minstens tot aan het midden der groote oogen reikende. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, met eene kielvormige middellijn, zonder ooglobben zooals bij de overige *Bagoini*; vooral aan de zijden roestkleurig beschubd, met een witachtig beschubden zijband; duidelijk bestippeld. Dekschilden kort en breed, met hoekig uitstekende schouders en iets gegroefde stippellijnen; eenigszins marmerachtig, roestkleurig en zwartachtig, vlekkelig beschubd, met hier en daar een witachtig schubvlekje. Onderzijde en pooten (vooral de dijen) vrij dicht witachtig beschubd. Schenen met een zeer korte, fijne eindspoor. — Wellicht is deze mededeeling geschikt, om in een volgend seizoen op *Asolla* in ons land waarnemingen te doen.

Den Haag.

ED. EVERTS.