

### Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, III.

*Platynus sexpunctatus* L. Exemplaren, bij welke de dekschilden groen en daarbij roodachtig iriseerend zijn, behooren tot ab. c. *versicolor* LETZN. Ik ontving een fraai exemplaar uit Deurne (N.-Br.), van Dr. MAC GILLAVRY.

*Pterostichus nigrita* F. var. *rhaeticus* KR. is naar een zeer kleinen vorm uit de Zwitsersche Alpen beschreven, doch komt ook elders voor; ik ving voor jaren een paar exemplaren langs het Scheveningsche strand, in April. Naar de geringe grootte zou men ze op het eerste gezicht voor *P. gracilis* DEJ. houden.

*Amara similata* GYLH. Een op de bovenzijde groenachtig exemplaar, bij Middelburg gevangen, behoort tot ab. c. *viridis* LETZN.

*Amara ovata* FAB. Groenachtige exemplaren zijn, evenals bij *similata*, zeldzaam; ik zag van deze ab. c. *viridis* LETZN. exemplaren uit den Haag en Brummen.

*Amara communis* PANZ. De zeldzame groenachtige ab. c. *viridis* LETZN. bezit ik van Jhr. VAN HEURN uit Loosduinen (Kijkduin).

*Amara lunicollis* SCHIÖDTE. Ook bij deze soort is door LETZNER eene zeldzame ab. c. *viridis* beschreven; ik bezit deze uit Bunde bij Maastricht (MAURISSEN). Een volkomen zwart exemplaar (ab. c. *nigra* LETZN.) bezit ik uit Exaeten (Limburg), voor vele jaren van Pater WASMANN ontvangen.

*Amara curta* DEJ. De geheel zwarte ab. c. *nigra* LETZN. bezit ik uit den Haag.

*Amara aenea* DE GEER. De op de bovenzijde glanzig-groene ab. c. *viridis* LETZN. bezit ik uit Utrecht.

*Amara spreta* DEJ. Exemplaren met diep-zwarte bovenzijde (*A. nigra* LETZN.) zijn op enkele plaatsen in Noord-Brabant en Limburg gevangen. Het, in de „5<sup>e</sup> Lijst van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche fauna” (in Tijdschr. v. Entom., Deel LI, 1908), vermelde ♀ met zwarte schenen, uit Ede, behoort tot ab. c. *nigripes* SCHILSKY. Mr. UYTENBOOGAART was zoo vriendelijk, dit ex. voor mijne collectie af te staan.

*Amara famelica* ZIMM. Een op de bovenzijde geheel zwart exemplaar (ab. c. *nigricans* SCHILSKY) ontving ik uit Roermond (Mr. UYTENBOOGAART).

*Amara curynota* PANZ. Een op de bovenzijde volkomen koolzwart exemplaar, uit Maastricht (wijlen Mr. LEESBERG), behoort tot ab. c. *nigra* LETZN. Bij een dergelijk exemplaar uit Nijmegen, voor vele jaren van Dr. A. C. OUDEMANS ontvangen, is langs de zijden nog een geringe groenachtige tint te herkennen.

*Amara lucida* DFTS. Een op de bovenzijde fraai groen exemplaar (ab. c. *viridis* LETZN.) ontving ik voor vele jaren van Pater WASMANN, bij Exaeten (Limburg), in 1886, gevangen.

*Hydroporus palustris* L. De in Deel II van de „Coleoptera Neerlandica”, Aanhangsel, blz. 668, beschreven ab. c. *apicalis* SCHILSKY komt hier en daar met het type voor, doch is niet algemeen.

*Micropeplus staphylinoides* MRSII. Deze soort, van welke eene vroegere opgave (den Haag, in de „Coleoptera Neerlandica”) onjuist gebleken is <sup>1)</sup>, is thans, met zekerheid, door Dr. D. MAC GILLAVRY, bij Valkenburg (L.), Sept., gevangen; het exemplaar werd welwillend voor mijne collectie afgestaan.”

*Epuraea terminalis* MANNERII. Eén exemplaar bij Huis ter Heide (Utr.), Mei (M. M. SCHEPMAN).

*Pelonium Meieri* SCHENKLG. Deze, waarschijnlijk uit Zuid-Amerika afkomstige *Cleride*, werd in eenige exemplaren, tegelijk met een massa exemplaren van *Xylotheca Meieri* REITT., in Rotterdam uit dividivi verzameld. Van den heer G. VAN ROON ontving ik, in dank, een paar exemplaren voor mijne collectie. Deze soort werd door S. SCHENKLING in het „Deutsche Entomol. Zeitschr.” 1900, blz. 408, uit Hamburg beschreven. De „Cat. Col. Eur.” etc., REITTER, 1906, en SCHILSKY's „System. Verzeichniss der Käfer Deutschlands 1909” vermelden deze als „geïmporteerd” en brengen het genus *Pelonium* SPINOLA tot den tribus *Enopliini*. Kenmerkend voor dit genus zijn de sprieten, die het meest met die van *Ortho-*

<sup>1)</sup> Zie: Achtste Lijst van Soorten en variëteiten *nieuw* voor de Nederlandsche fauna, etc.; in Tijdschr. voor Entomol., Deel LV, 1912.

*pleura* SPINOLA (zie „Col. Neerl.” II, blz. 206) overeenkomen, het bijlvormig eindlid der tasters en de zijbulten van het halsschild. De soort-beschrijving, volgens SCHENKLING, luidt aldus: „Kop en halsschild zeer dicht en vrij sterk bestippeld, roodbruin; voorhoofd met vlakke groefjes. Halsschild aan weerszijden, achter het midden, met eene spitse bult; aan weerszijden van den achterrand met een klein rond bultje. Tasters en de 10-ledige sprieten geel. Dekschilden tot aan het uiteinde dicht in rijen bestippeld, lichter gekleurd dan kop en halsschild; in het midden van elk met eene ronde (bij mijne exemplaren meer verbreedde) zwarte vlek en voor het uiteinde met een gemeenschappelijken, iets getanden, zwarten dwarsband, welke den zijrand niet volkomen bereikt; ook om het schildje en aan den achterrand der dekschilden zwartachtig aangelopen (wat bij mijne exemplaren niet het geval is). Onderzijde en pooten geel tot roodbruin. Lengte 3.8 mm. (bij mijne exemplaren ongeveer 4 mm.).

*Gastroidea polygoni* L. Exemplaren met groene dekschilden zijn: ab. c. *ruficollis* F.; zij zijn zeldzamer dan die met blauwe, of violette dekschilden.

#### C o r r i g e n d a.

In „Col. Neerl.”, Deel II, blz. 553, in de Tabel, bij 28, *Limobius* (regel 5 v. b.), staat: „Scapus tot aan den voorrand der oogen reikend”, terwijl op blz. 605 in de beschrijving van dit genus, ten onrechte staat: „de scapus de oogen duidelijk overschrijdend”; dit laatste moet dus verbeterd worden.

Den Haag.

ED. EVERTS.

---

#### Geluidmakende Vlinders.

Het is een bekend feit, dat de *Ageronia*'s onder het vliegen een soort geritsel doen hooren. Hoe deze dieren daartoe in staat zijn, was tot voor korten tijd nog een probleem. Nu was de heer H. FRUHSTORFER zoo vriendelijk, mij een overdrukje toe te sturen uit „The Entomologist's Record”, Vol. XXVII, No. 5, 1915, waar een stukje in voorkomt van de hand van Dr. J. L. REVERDIN. Laatstgenoemde onder-