

ving bij Valkenburg (Limb.), Aug., een fraai groen exemplaar, zooals ik nimmer uit Nederland zag en, naar het schijnt, uit Oost-Europa bekend is, althans REITTER zegt: „sehr selten ganz schwarz [a. * *nigra* WSE. (niet incl.)] oder grasgrün (a. *perviridis* nov.)”, welke laatste ab.c., al geeft REITTER Podolien en Rumänien als vindplaatsen op, toch volkomen op ons exemplaar doelt. Zwartgroene exemplaren zijn mij uit Nederland niet bekend. Ik vermoed, dat de a. *perviridis* REITT. ook wel elders in West-Europa zal gevonden zijn. Dank zij de vrijgevigheid van den heer KERKHOVEN is het exemplaar in mijne collectie geplaatst.

Den Haag.

ED. EVERTS.

**Interessante vondsten, op de excursies bij
Ommen, Juni 1916, gevangen.**

<i>Leïstus rufomarginatus</i> DFTS.	<i>Euaesthetus atricapillus</i>
<i>Nebria livida</i> L. var. <i>lateralis</i>	[BOISD. & LAC.
<i>Omophron limbatus</i> F. [F.	<i>Stenus incanus</i> ER.
<i>Dyschirius obscurus</i> GYLH.	» <i>palposus</i> ZETT.
» <i>thoracicus</i> ROSSI	» <i>niveus</i> FAUV. faun.
[a. <i>niger</i> AHR.	[nov. sp.
» <i>politus</i> DEJ.	» <i>geniculatus</i> GRAV.
<i>Bembidion striatum</i> F.	<i>Bledius femoralis</i> GYLH.
» <i>velox</i> L.	» <i>denticollis</i> FAUV.
» <i>litorale</i> OLIV.	<i>Phyllodrepa vilis</i> ER.
[a. <i>melanoticum</i> H.WAGN.	<i>Bythinus bulbifer</i> REICHB.
<i>Hydroporus neglectus</i> SCHAUM.	<i>Cychramus luteus</i> F.
<i>Calodera riparia</i> ER.	<i>Rhizophagus politus</i> HELLW.
<i>Myllaena dubia</i> GRAV.	<i>Combocerus glaber</i> SCHALL.
<i>Hypocyptus seminulum</i> ER.	[faun. nov. sp.
<i>Tachyporus transversalis</i>	<i>Syncalypta paleata</i> ER.
[GRAV.	<i>Heterocerus intermedius</i> KSW.
<i>Philonthus decorus</i> GRAV.	<i>Helophorus arvernicus</i> MLS.
» <i>nigrita</i> GRAV.	<i>Agrilus elongatus</i> HRBST.
<i>Lathrobium rufipenne</i> GYLH.	» <i>laticornis</i> ILL.
» <i>laevipenne</i> HEER.	<i>Cardiophorus ruficollis</i> L.

<i>Corymbites impressus</i> F.	<i>Galerucella grisescens</i> JOANN.
» <i>nigricornis</i> PANZ.	(<i>sagittariae</i> GYLH.)
<i>Scaphidema metallicum</i> F.	<i>Aphthona lutescens</i> GYLH.
<i>Hypophloeus linearis</i> F.	<i>Longitarsus pellucidus</i> FOUDR.
<i>Hylophilus nigrinus</i> GERM.	<i>Polydrosus flavipes</i> DE GEER.
<i>Salpingus aeneus</i> STEPH.	<i>Hylobius transversovittatus</i>
<i>Acmaeops marginata</i> F. type,	[GOEZE.
[faun. nov. sp.	<i>Ceuthorrynychus scapularis</i>
<i>Leptura nigra</i> L.	[GYLL.
<i>Stenopterus rufus</i> L.	<i>Tapinotus sellatus</i> F.
<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i>	<i>Oxystoma subulatum</i> KIRBY.
[L.	

Den Haag.

ED. EVERTS.

Acarologische Aanteekeningen LXI.

Scutacaridae (vervolg van p. 316).

De volgende teekeningen van PAOLI zijn goed: Fig. 10, 19, 22, 30, 34, 48, 57; alle overige zijn fout.

Deze tergieten of rugplaten buigen zich lateraal ventraad om, vormen daar eveneens „fasce” = chitineuse dwarsbanden of sternieten; eigenlijk bestaat het „abdomen” der *Scutacaridae* dus uit drie ringen en één platten dop of kap, die de achterlijfspits beschermt.

Pediculoides setosus nov. sp.

♀. In het kort gezegd: deze soort staat tusschen *P. pilosus* OUDMS. en *P. spinosus* KRAM. Lichaamsbouw, pootvorm, beharing, enz. als van *pilosus*; tibiotarsus I als van *spinosus*, doch niet zoo vierkant, meer ovaal. — Op *Catharsius molossus* L., Java, II, 1903, Dr. H. J. VETH.

Scutacarus Gros 1845.

Deze naam moet in het vervolg dien van *Disparipes* MICHAEL 1884 vervangen, zooals duidelijk wordt, wanneer men het hieronderstaande leest.

Scutacarus femoris Gros 1845.

GROS in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., v. 18, 1845, p. 413, 414, beschrijft uitvoerig eene *Acarus* onder den naam