

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 93.

DEEL IV.

1 Jan. 1917.

INHOUD: A. J. BUIS. *Mamestra glauca* Hbn. bij Breda. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS. Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, VIII. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS. Overzicht van de van 1 Nov. 1915 tot 1 Nov. 1916 in de Ent. Ber. gepubliceerde Coleoptera-soorten en -variëteiten, nieuw voor de Nederlandsche Fauna. — Jhr. Dr. Ed. J. G. EVERTS. Nog bij te voegen interessante vondsten op de excursies bij Ommen. — R. VAN EECKE. *Oryzaephilus surinamensis* L. schadelijk in bloembollen. — Dr. A. C. OUDEMANS. Boekweitdoppen als dek voor bollevelden. — Dr. A. C. OUDEMANS. Acarologische Aanteekeningen LXII.

***Mamestra glauca* Hbn. bij Breda.**

Op pag. 316 van deel LIII v. h. Tijdschr. v. Entom. is melding gemaakt van een vrouwelijk exemplaar van *Mamestra glauca* HBN. door den Heer N. A. DE JONCHEERE op 22 Mei 1909 bij Breda (Mastbosch) gevonden.

Deze voor onze Fauna nieuwe soort is, voor zooverre mij bekend, sedert dien in Nederland niet meer waargenomen.

Hoewel reeds acht jaar in Breda woonachtig en veel in voornoemd bosch wandelende, was het mij niet gelukt een tweede exemplaar van deze soort te vinden.

Op 18 Mei j.l. was het geluk mij evenwel dienstig en maakte mijne vrouw mij opmerkzaam op een vlinder, die vrij vlug tegen een dennenboom opliep.

Bij nader onderzoek bleek dit een frisch exemplaar (♂) van *Mamestra glauca* HBN. te zijn. De vindplaats was ongeveer dezelfde als die van den Heer DE JONCHEERE.

Thans mag dus wel worden aangenomen, dat deze soort in het Mastbosch alhier geregeld, maar lokaal en zeldzaam voorkomt.

A. J. BUIS.

Breda.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna VIII.

294. ¹⁾ *Acupalpus* (sub-gen. *Balius* SCHIÖDTE = *Anthracus* MOTSCH.) *consputus* DFTSCHM., var. *Wimmeli* REITTER. Een goed uitgekleurd, donker exemplaar bezit ik uit aanspoelsel van de Maas, bij Steyl (Limb.), Dec. Deze, bij Hamburg ontdekte, vorm, welke door REITTER als goede soort werd beschreven, is, volgens TH. VON WANKA (Wien. Ent. Zeit. 1915), eene var. van *A. consputus*, welke zich daarvan onderscheidt, doordat de kop, met de oogen, even zoo breed of nagenoeg even zoo breed is als het halsschild, terwijl deze bij het type opvallend smaller is. Het halsschild is nagenoeg over de geheele schijf zwartbruin (of roodbruin!), terwijl de bruinachtig-gele dekschilden tezamen op het achtergedeelte veel meer, naar voren en naar de randen, uitgebreid zwartachtig of berookt zijn; bij het type daarentegen zijn de dekschilden elk van eene donkere discoidaalvlek voorzien en is het halsschild geelrood of over het midden iets donkerder.

VON WANKA beschrijft nog een, mij onbekende, var. *Reitteri* (van *Wimmeli*), welke als tusschenvorm zou moeten beschouwd worden. Bij deze is de kop, met de oogen, evenals bij het type, veel smaller dan het halsschild, met minder uitpuilende oogen, met smal en van voren minder afgerond-verbreed halsschild; ook zouden de middelste sprietleedjes iets korter zijn dan bij *consputus*. Bij Berlijn schijnt deze var. meer voor te komen dan het type.

323^{bis}. *Dromius meridionalis* DEJ. Van deze, meer in zuidelijker streken levende, soort werd, door Mevrouw E. UYTENBOOGAART, geb. ELIASSEN, in Rotterdam een exemplaar gevangen, dat door een raam, dat op een grooten stadstuin

¹⁾ De nummers verwijzen naar mijne „Lijst der in Nederland en het aangrenzend gebied voorkomende Coleoptera, 1906.”