

Oryzaephilus surinamensis L. schadelijk voor bloembollen.

Dr. W. C. DE GRAAFF, lector te Leiden en sinds kort hoogleeraar te Utrecht, bracht mij eenige voorwerpen van bovengenoemde Cucujide, die te Lisse dit jaar schadelijk was voor de te veld staande bloembollen. De oorzaak van de aanwezigheid dezer Cucujide aldaar moet gezocht worden in het feit, dat de kweekers boekweitdoppen als dek gebruikten. De larven voeden zich n.l. met verschillende gedroogde waren, als gedroogde appels, vijgen, zemelen, enz., o. a. ook met boekweitdoppen. De imagines zijn uit het dek in de bollen gekropen en hebben zich daarin te goed gedaan tot nadeel van de kweekers.

Het blijkt dus niet onverschillig te zijn, welk dek voor de bollen gebruikt wordt.

R. VAN EECKE.

Leiden.

Boekweitdoppen als dek voor bollevelden.

Bovenstaande mededeeling van den heer R. VAN EECKE, betreffende het gevaar van het gebruik van boekweitdoppen als dek voor bollevelden, doet mij de pen opvatten om heeren bollekweekers er op te wijzen, dat er nog een andere vijand, misschien wel verscheidene, in de boekweitdoppen schuilen. Dergelijk droog afval van grutterswaren is n.l. een kweekplaats van verscheidene soorten van mijten, voornamelijk behorende tot het genus *Tyroglyphus* LATR., waarvan *T. farinae* L., de meelmijt, de voornaamste is, en voor wie de hyacinthebol een buitengewoon goed voedsel blijkt te zijn, althans de exemplaren, die ik eens de gelegenheid had te onderzoeken, en die uit hyacinthebollen afkomstig waren, zagen er buitengewoon welgedaan en prachtig gekleurd uit, waren een lust om te zien.

Aan bollekweekers mag ik derhalve den raad niet onthouden: stel, alvorens boekweitdoppen als dek te gebruiken, deze bloot aan eene verschroeiende hitte, zoodat alle daarin levende Cucujidenlarven, alsmede eieren, larven, nymphen en volwassen Tyroglyphiden en wie weet hoeveel meer gedierten, gedood zijn.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.
