

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 52.

DEEL III.


1 Maart 1910.

INHOUD: Dr. D. MAC GILLAVRY, Aanteekeningen over Rhynchota Homoptera I. — Dr. D. MAC GILLAVRY, Rhynchota Heteroptera, gevangen in het Westelijke Middellandsche-Zee-gebied. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen XXXI. — Dr. A. C. OUDEMANS, Aanteekeningen over Suctoria XVI. — C. A. L. SMITS VAN BURGST, De nonvlinderplaag. — H. SCHMITZ S. J., Een merkwaardig Strepsipteron. — Mr. D. L. UYTENBOOGAART, Coleoptera verzameld in de omstreken van Maastricht en Valkenburg, Juni 1909 (gedetermineerd door Jhr. Dr. Ed. Everts), 2e Lijst. — Jhr. Dr. ED. EVERTS, Boekaankondiging (J. Schilsky, Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs). — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek.

Aanteekeningen over Rhynchota Homoptera I.

Na het vijftal Cicadologische Aanteekeningen van BIERMAN, gepubliceerd in deel II van deze Entomologische Berichten, zijn door BIERMAN en door anderen vele nieuwe vondsten op dit gebied gedaan.

Ik stel mij voor het door Bierman aangevangen werk voort te zetten, en in de eerste plaats het voor onze fauna belangrijke van tijd tot tijd te publiceeren, daarbij beginnende met het vermelden der voor de fauna nieuwe species.



Vooraf moet ik echter opmerken, dat drie der door BIERMAN als nieuw opgegeven soorten n.l. *Chloriona prasinula* Fieb. (Ent. Ber. No. 34, p. 165), *Idiocerus kerrichii* Kb. (Ent. Ber. No. 30, p. 114) en *Bythoscopus rufusculus* Fieb. (Ent. Ber. No. 34, p. 165) reeds vroeger als nieuw voor de fauna waren opgegeven door FOKKER, die deze soorten benevens *Cixius simplex* H. S. en *Cicadula 7-notata* Fall. vermeldt in Deel 42 van het Tijdschrift voor Entomologie, pag. 36.

Ook zijn verscheidene soorten, indertijd door SNELLEN VAN VOLLENHOVEN gepubliceerd in het Tijdschr. v. Ent. Deel 22, pag. XI en door FOKKER niet opgenomen in zijn lijst (l. c. Deel 34, p. 378), door BIERMAN definitief tot de Nederlandsche fauna gebracht.

Dit zijn de volgende soorten, waarbij het nummer der Ent. Ber., waarin zij door BIERMAN zijn gepubliceerd, telkens tusschen haakjes vermeld wordt.

Dicraneura citrinella Zett. (34).

Typhlocyba scutellaris H. S. (30).

» *cruenta* H. S. (38).

Eupteryx germari Zett. (34).

» *stellulata* Burm. (38).

Terwijl in 1891 door FOKKER 146 soorten waren bekend gemaakt, waaraan hij, zooals bovengezegd, 5 toevoegde in 1900, werden door BIERMAN 25 soorten vermeld, waarvan er dus 3 moeten vervallen. Het totale aantal was derhalve 173.

Aan dit aantal kan ik nu een tiental toevoegen, waardoor het getal Nederlandsche Homoptera tot 183 klimt.

**Asiraca clavicornis* Latr.

Z. Limburg, 6, Uyttenboogaart, een ♀.

**Eurysa lineata* Perris.

Pietersberg, 6, Mc G., een ♂.

**Idiocerus scurra* Germ.

Amsterdam, 10, Koornneef, twee ♀♀.

**Errhomenus brachypterus* Fieb.

Pietersberg, 6, 7, Mc G. Het eerste exemplaar werd door mij reeds vermeld op de Wintervergadering, Jan. 1908, pag. XIX. Het tweede werd ruim een jaar later terzelfder plaatse gevangen en was eveneens manlijk.

**Deltocephalus socialis* Flor.

Maastricht, 6, Mc G., een ♀, nog door Bierman gedetermineerd.

**Athysanus ocellaris* Leth.

Hilversum, 7, Mc G., een ♀.

**Athysanus sordidus* Zett.

Arnhem, 7, Bierman (1 brachypteer ♂, 1 macropteer ♀),
Z. Limburg, 6, Uyttenb. (1 macropteer ♂), Gulpen,
7, Mc G. (1 ♀, dekschilden iets verkort).

**Thamnotettix abietinus* Fall.

Oldenzaal, 7, de Meijere, een ♀.

**Thamnotettix dilutior* Kb.

Hilversum, 7, Mc G., een ♀, Bussum, 7, Koornneef, een ♀. Bovendien bezit ik eenige exemplaren door Bierman te Arnhem, 6, gevangen, waarvan ik nog niet zeker durf zeggen, of zij tot deze soort dan wel tot *Th. subfuscus* Fall. behooren.

**Zygina hyperici* H. S.

Hilversum, 7, Mc G. een wijfje, waarvan de determinatie eveneens door Bierman werd verricht.

D. MAC GILLAVRY.
