

eieren werden gelegd. Paring heb ik in de gevangenschap maar tweemaal waargenomen. In mijn bezit bevinden zich eenige eieren van deze gedegenereerde vlinders afkomstig, welke rupsjes inhouden. Het is van belang om na te gaan of, en zoo ja, in welke mate de ontaarding op de nakomelingen zal overgaan.

Ik stel mij voor het in 1909 onder Alphen verzamelde materiaal tentoon te stellen op de in Juni 1910 te 's-Gravenhage te houden Biologische Tentoonstelling.

SMITS VAN BURGST.

Een merkwaardig Strepsipteron.

De heer KARL HOFENEDER S. J. zond voor de bibliotheek der N. E. V. een overdruk van zijne publicatie: *Mengenilla n. g. Chobautii* n. sp. Eine neue Strepsiptere aus Nord-Afrika. Berichte des Naturw. med. Vereins Innsbruck XXXI Jahrg. 1910, 33—58, 2 Taf. Daarin wordt een door Dr. A. Chobaut in Algiers gevonden Strepsipteron ♂ beschreven, dat van alle thans bekende recente vormen afwijkt door het bezit van 5-ledige tarsen met duidelijke klauwen. De nieuwe soort komt in dit kenmerk overeen met het fossiele genus *Mengea*, maar is ook van dit genus onderscheiden in vele opzichten o.a. door 6-ledige sprieten en moet derhalve als type eener nieuwe familie *Mengenillidae* beschouwd worden. De gastheer is nog onbekend, het eenig exemplaar werd 'snachts bij licht gevangen. Het vraagstuk naar de verwantschap der *Strepsiptera* met andere insectenorden wordt ook door deze vondst niet opgelost; schr. deelt overigens de zienswijze van Handlirsch, die de *Coleoptera* en *Strepsiptera* als *Coleopteroidea* saamvat.

H. SCHMITZ S. J.
