

**COLEOPTERA**  
**verzameld in de omstreken van Maastricht en Valkenburg**  
**Juni 1909**

(gedetermineerd door Jhr. Dr. Ed. Everts).

2E L I S T.

<i>Cis oblongus</i> Mellié	<i>Athous haemorrhoidalis</i> F.
<i>Octotemnus glabriulus</i> Gylh.	» <i>vittatus</i> F.
<i>Lyctus unipunctatus</i> Herbst	» » <i>ab.c.angularis</i> Steph.
<i>Aphodius erraticus</i> L.	» » <i>Oeskayi</i> Ksw.
» <i>subterraneus</i> L.	» <i>longicollis</i> Oliv.
» <i>fossor</i> L.	» <i>sputator</i> L.
» <i>granarius</i> L.	» <i>pallidulus</i> Ill.
» <i>rufus</i> Moll.	<i>Synaptus filiformis</i> F.
» <i>nitidulus</i> F.	<i>Adrastus nanus</i> Herbst.
» <i>pusillus</i> Herbst	<i>Lampyris noctiluca</i> L. ♂ ♀.
» <i>sticticus</i> Panz.	<i>Lamprohiza splendidula</i> L. ♂ ♀.
» <i>prodromus</i> Brahm.	<i>Phosphaenus hemipterus</i> Geoffr. ♂.
» <i>luridus</i> F. ab. c.	<i>Telephorus nigricans</i> Müll. ab. c.
<i>nigripes</i> F.	<i>immaculatus</i> Schilsky.
<i>Copris lunaris</i> L. ♂ ♀.	<i>Telephorus rufus</i> L. var. <i>lituratus</i>
<i>Hoplia philanthus</i> Füssl.	Fall.
<i>Oxythyrea funesta</i> Poda	<i>Telephorus pallidus</i> Goeze.
<i>Cetonia aurata</i> L.	<i>Rhagonycha fulva</i> Scop.
<i>Valgus hemipterus</i> L.	» <i>lutea</i> Müll.
<i>Gnorimus nobilis</i> L.	» <i>limbata</i> Ths.
<i>Trichius rosaceus</i> Voet	» <i>pallida</i> F.
<i>Agrilus elongatus</i> Herbst	» <i>atra</i> L.
<i>Throscus dermestoides</i> L.	<i>Malthinus flaveolus</i> Payk.
<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Er.	» <i>seriepunctatus</i> Ksw.
<i>Limonius minutus</i> L.	» <i>balteatus</i> Suffr.
<i>Pheletes aeneoniger</i> de G.	<i>Malthodes dispar</i> Germ.
<i>Athous alpinus</i> Redt.	<i>Axinotarsus pulicarius</i> F.

<i>Axinotarsus marginalis</i> Lap.	<i>Cryptocephalus Moraei</i> L.
<i>Ebaeus thoracicus</i> Fourer.	» <i>labiatus</i> L.
<i>Sphinginus lobatus</i> Oliv.	<i>Oomorphus concolor</i> St.
<i>Charopus pallipes</i> Oliv.	<i>Timarcha tenebricosa</i> F.
<i>Homalisus Fontisbellaquei</i> Fourer.	» <i>coriaria</i> Laich.
<i>Apate capucina</i> L.	<i>Chrysomela goettingensis</i> L.
<i>Dryophilus pusillus</i> Gylh.	» <i>staphylea</i> L.
<i>Anobium fulricorne</i> St. » <i>nitidum</i> Herbst	» <i>sanguinolenta</i> L.
<i>Xestobium plumbeum</i> Ill. ab. c. <i>variabile</i> Dej.	» <i>menthastri</i> Suffr.
<i>Ernobius mollis</i> L.	<i>Luperus niger</i> Goeze
<i>Anaspis Costae</i> Emery » <i>flava</i> L.	<i>Crepidodera transversa</i> Mrsh.
» » <i>var. thoracica</i> Emery.	» <i>ferruginea</i> Scop.
<i>Anaspis pulicaria</i> Costa » <i>frontalis</i> L.	» <i>splendens</i> Weise
» <i>thoracica</i> L.	» » ab. c.
» <i>ruficollis</i> F.	» <i>gaudens</i> Steph.
» <i>Geoffroyi</i> Müll.	<i>Hippuriphila Modeeri</i> L.
» <i>maculata</i> Fourer. » » ab. c. <i>pallida</i>	<i>Mantura rustica</i> L.
Marsh	<i>Chaetocnema concinna</i> Mrsh.
<i>Mordellistena lateralis</i> Ol.	<i>Psylliodes affinis</i> Payk.
<i>Anthicus basilaris</i> Say	» <i>hyoscyami</i> L.
<i>Oedemera n. bilis</i> Scop.	<i>Phyllotreta undulata</i> Kuts.
<i>Acmaeops collaris</i> L.	» <i>nemorum</i> L.
<i>Agapanthia villoso-viridescens</i> de G.	» <i>atra</i> F.
<i>Clytra flavigollis</i> Charp.	» <i>cruciferae</i> Goeze
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> L.	» <i>aerea</i> All.
	» <i>nigripes</i> F.
	<i>Longitarsus melanocephalus</i> de G.
	» <i>succineus</i> Foudr.
	<i>Apteropeda orbiculata</i> Mrsh.
	<i>Sphaeroderma testaceum</i> F.
	» <i>rubidum</i> Graëlls.
	<i>Cassida vittata</i> Villers.
	<i>Urodon rufipes</i> Ol.

<i>Urodon suturalis</i> F.	<i>Hypera arator</i> L.
<i>Brachytarsus variegatus</i> Fourer.	» <i>variabilis</i> Herbst ab. c.
<i>Rhynchites purpureus</i> L.	<i>postica</i> Gylh.
» <i>minutus</i> Herbst	
» <i>tomentosus</i> Gylh.	
<i>Otiorrhynchus tenebricosus</i>	<i>Liparus coronatus</i> Goeze.
Herbst	<i>Dorytomus longimanus</i> Forst.
<i>Otiorrhynchus ligneus</i> Ol.	» <i>filirostris</i> Gylh.
» <i>porcatus</i> Herbst	» <i>validirostris</i> Gylh.
» <i>singularis</i> L.	» <i>pectoralis</i> Gylh.
<i>Peritelus hirticornis</i> Herbst	<i>Anoplus plantaris</i> Naezen.
<i>Trachyphloeus scabriculus</i> L.	<i>Orcheses stigma</i> Germ.
<i>Exomias pellucidus</i> Boh.	» <i>populi</i> F.
<i>Brachysomus echinatus</i> Bonsd.	» <i>saliceti</i> Payk.
<i>Strophosomus rufipes</i> Steph.	<i>Rhamphus pulicarius</i> Herbst
» <i>capitatus</i> de G.	<i>Magdalis cerasi</i> L.
<i>Brachyderes incanus</i> L.	<i>Tychius junceus</i> Reich.
<i>Sciaphilus asperatus</i> Bonsd.	» <i>tomentosus</i> Herbst
<i>Liophloeus tessulatus</i> Müll.	» <i>picrostrois</i> F.
<i>Polydrosus cervinus</i> L.	<i>Ceutorrhynchidius troglodytes</i> F.
<i>Phyllobius oblongus</i> F. ab. c.	» <i>floralis</i> Payk.
floricola Herbst.	» <i>pyrrhorhynchus</i>
<i>Phyllobius calcaratus</i> F.	Mrsh.
» <i>urticae</i> de G. var.	<i>Ceutorrhynchidius terminatus</i>
<i>Fussi</i> Schilsky	Herbst
<i>Phyllobius betulae</i> F.	<i>Ceutorrhynchus geographicus</i>
» <i>viride-aeris</i> Laich.	Goeze
<i>Chlorophanus viridis</i> L.	<i>Ceutorrhynchus viduatus</i> Gylh.
<i>Sitona humeralis</i> Steph.	» <i>pleurostigma</i>
» <i>lateralis</i> Gylh. var. <i>ononis</i>	Mrsh.
Sharp	<i>Ceutorrhynchus asperifoliarum</i>
<i>Sitona lineatus</i> L. ab. c. <i>geniculatus</i> Fahrs.	Gylh.
	<i>Ceutorrhynchus rugulosus</i> Herbst.
	» <i>consputus</i> Germ.
	» <i>trimaculatus</i> F.

<i>Ceutorrhynchus erysimi</i> F.	<i>Apion nigritarse</i> Kirby
» <i>contractus</i> Mrsh.	» <i>aethiops</i> Herbst.
» <i>assimilis</i> Payk.	» <i>pisi</i> F.
<i>Rhinoncus bruchoides</i> Herbst	» <i>punctigerum</i> Payk.
» <i>pericarpius</i> L.	» <i>ononis</i> Kirby
» <i>guttalis</i> Grav.	» <i>ervi</i> Kirby
<i>Baris picicornis</i> Mrsh.	» <i>viciae</i> Payk.
<i>Oxystoma pomonae</i> F.	» <i>tenue</i> Kirby
» <i>eraccae</i> L.	» <i>seniculum</i> Kirby
» <i>ochropus</i> Germ. ♀.	» <i>minimum</i> Herbst
<i>Apion onopordi</i> Kirby	» <i>curtiostre</i> Germ.
» <i>rufirostre</i> F.	» <i>affine</i> Kirby
» <i>ononicola</i> Bach.	» <i>violaceum</i> Kirby
» <i>apricans</i> Herbst	<i>Scolytus rugulosus</i> Ratz.

D. L. UYTENBOOGAART.

### BOEKAANKONDIGING.

Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete, zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Herausgegeben von J. Schilsky. Stuttgart. Verlag von Strecker & Schröder. 1909. Oktav. 15 vel druk. Mark 5.50; gebonden Mark 6.50.

De faunistische literatuur is wederom verrijkt met een uitmuntend werk, waarin de thans bekende Coleoptera van Duitschland en Duitsch-Oostenrijk in systematische volgorde opgesomd zijn. Vergelijkt men dezen catalogus van den, door zijne voortreffelijke beschrijvingen in het door hem voortge-