

Aanteekeningen over *Suctoria* XVII.

Fauna des Altvaters.

De namen, die KOLENATI aan eenige *Suctoria* geeft in zijn »Fauna des Altvaters, 1859«, worden steeds genegeerd, omdat het werkje zoogenaamd onbereikbaar, of ontoegankelijk is. Ik ben tot de ontdekking gekomen, dat hetzelfde opstel, doch onder den titel van »Naturhistorische Durchforschung des Altvatergebirges« voorkomt in »Jahresheft der naturwissenschaftlichen Section der K. K. mähr. schles. Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde für das Jahr 1858«; Brünn 1859. Zelfs de paginatuur is dezelfde. Daar ook dit Tijdschrift uiterst zeldzaam is (ik kon het door de welwillendheid van den heer A. A. van Pelt Lechner te Wageningen inzien) schrijf ik het gedeelte, dat over *Suctoria* handelt, hier over:

- p. 65. **Aphaniptera.** Flöhe. (N. B. n°. 1—38 zijn Diptera).
- Pulex.** Linné. Floh.
- 39 . . *irritans*. Linné. Gemeiner Floh. Sehr häufig im August und September am Heuboden und in den Schlaflokali-täten der Schweizerei. Eine Nachtplage der Anreisenden.
- Ceratopsyllus.** Curtis. Kammfloh. Kopf vorne gezähnt, Rücken-ctenidien.
- 40 . . *octactenus*. Kolenati. Der achtkämmige Floh. Mit 8 Rücken-ctenidien. An *Amblyotus atratus* Kolenati.
- Ctenophthalmus.** Kolenati. Augenkammfloh. Unterhalb des Auges ein Ctenidium, der Kopf ungezähnt.
- 41 . . *bisbidentatus*. Kolenati. Der Maulwurfsfloh. Mit einem vier-zähnigen Augenctenidium und 16-zähnigen Rückenctenidi-um, der Kopf vorne ungezähnt. An *Talpa europaea*, sehr häufig, im August, September.
- 42 . . *unidentatus*. Kolenati. Der Spitzmausfloh. Mit einem ein-zähnigen Augen- und 16-zähnigen Rückenctenidium, Kopf

- vorne ohne Zahn. An Spitzmäusen, August, September.
- 43.. *quadridentatus*. Kolenati. Der Hausmausfloh. Mit einem vierzähnigen Augen- und 18-zähnigen Rückenctenidium, Kopf vorne ungezähnt. An der Hausmaus häufig.
- Ctenocephalus.** Kolenati. Kopfkammfloh. Der Kopf vorne gezähnt, mit oder ohne andere Ctenidien.
- 44.. *noremdentatus*. Kolenati. Der Hundefloh. Kopfctenidium 5-, Augenctenidium 4-, Rückenctenidium 18-zähnig, der erste Leibesring unbeborstet. Auf dem Haushunde, häufig im Sommer in der Schweizerei.
- 45.. *enneodus*. Kolenati. Der Katzenfloh. Kopfctenidium 5-, Augenctenidium 4-, Rückenctenidium 16-zähnig, der erste Leibesring mit 4 Reihen Borsten. Häufig an der Haus-Katze im Sommer in der Schweizerei.

Spalacopsylla bisbidentatus (Kolenati) 1859.

Uit het bovenstaande blijkt, dat *bisbidentatus* geen »nomen nudum« is, derhalve als soortnaam geldig is. De synonymen zijn derhalve: 1835, *Pulex talpae* Bouché (non Curtis 1826); 1856, *Ctenophthalmus talpae* Kolenati; 1863, *Ctenophthalmus bisoctodentatus* Kolenati; 1900, Oct., *Typhlopsylla bisoctodentata* Wagner; 1900, *Typhlopsylla orientalis* Rothschild; 1900, *Typhlopsylla bisseptemdentata* Rothschild.

Spalacopsylla unidentatus (Kolenati) 1859.

Uit het bovenstaande blijkt, dat *unidentatus* geen nomen nudum is, derhalve als soortnaam geldig is. De synonymen zijn derhalve: 1863, *Ctenophthalmus bisseptemdentatus* Kolenati; 1880, *Typhlopsylla assimilis* Taschenberg; 1905, *Ctenophthalmus assimilis* Baker.

A. C. OUDEMANS.