

geel); palpen en mandibels lichtgeel. Voorvleugels voor een deel zwak rookig, pterostigma donkerbruin. Tegulae lichtgeel. De toppen der voorcoxae, evenals de trochanters, dijen, schenen en tarsen der voorpooten lichtgeel; de toppen der middencoxae, alsmede de trochanters lichtgeel, middendijen roodachtig, middenschenen eveneens roodachtig, maar met donker getinte toppen, middentarsen donker; van de achterpooten zijn de coxae en het proximale lid der trochanters zwart, de trochantellus geelachtig, de dijen en schenen rood, laatstgenoemde met donker gekleurde toppen; de achtertarsen donkerbruin. Het eerste achterlijfssegment zwart (bij *discedens* met rooden achterrand), het tweede zwart, op de achterhelft met min of meer duidelijk doorschijnende geelachtig-bruine vlekken, de volgende segmenten rood met zwart. Plica ventralis bruinachtig (bij *discedens* naar het gele hellend). Lengte 6 mm.

Anilastus Henscheli onderscheidt zich van *A. discedens* Schmied, hoofdzakelijk door de anders gevormde areola, veroorzaakt door de uitmonding van den nervus recurrens in het midden van haar basis, voorts door den geheel zwarten scapus der sprieten en de teekeningen van het achterlijf en die der pooten. Laatstgenoemde soort vindt men beschreven in Schmiedeknechts Opuscula Ichneumonologica op bladz. 1808.

SMITS VAN BURGST.

Excursie te Winterswijk en Terborg, Juni 1910.

Notiophilus rujipes Curt. W.

Omophron limbatus F. T.

Elaphrus aureus Müll. T. W.

» *Ulrichii* W. Redt. T.

Bembidium elongatum Dej. T. W.

- Bembidium Mannerheimii* Sahlb. T.
 » *Doris* Gylh. W.
Patrobis excavatus Payk. T.
Amara famelica Zimm. T.
Harpalus rufus Brüggem. T.
 » *Frölichii* St. T.
Ocalea rivularis Mill. W. Faun. nov. sp.
Atheta insecta Thoms. W.
Leptacinus linearis Grav. T.
Stenus fossulatus Er. W.
 » *Argus* Grav. W.
 » *ater* Mannh. T.
Bledius Campi Bondroit T.
 » *subterraneus* Er. T.
 » *longulus* Er. T.
Oxytelus piceus L. ♀ T.
Trogophloeus impressus Boisd. & Lac. T.
Ancyrophorus flexuosus Fairm. W.
Bythinus bulbifer Reichb. T.
Triarthron Märkelii Schmidt. T.
Amphicyllis globulus F. a. *ferruginea* St. T.
Liodes humeralis Kugel. W.
Platysoma angustatum Hoffm. W.
Plegaderus vulneratus Panz. T.
Cychramus luteus F. v. *fungicola* Heer W.
Rhizophagus ferrugineus Payk. W.
Antherophagus nigricornis F. W.
Cryptophagus pubescens St. T.
Cis oblongus Mellié W.
Corticaria crenicollis Mannh. T.
Limnichus sericeus Dfts. T.
Trichius fasciatus L. W.
Agrilus coeruleus Rossi. T.

Limonius minutus L. T.

Corymbites impressus F. T.

Malthinus fasciatus Oliv. T.

Malthodes dispar Germ. W.

Avinotarsus ruficollis Oliv. T.

Pentaphyllus testaceus Hellw. Faun. nov. sp. Op het buitengoed Slangenbergh, achter boomschors. T.

Mordella aculeata L. W.

Chrysanthia viridis Schm. W. T.

Oedemera virescens L. T.

Leptura nigra L. W.

Cassida murraea L. W.

Tropideres sepicola F. T.

Byctiscus betuleti F. T.

Rhynchites tomentosus Gylh. T.

Deporaus megacephalus Germ. T.

Brachysomus echinatus Bonsd. W.

Dorytomus validirostris Gylh. W.

Acalyptus carpini F. W.

Ceuthorrhynchidius pyrrhorhynchus Marsh. T

» *pumilio* Gylh. T.

Ceuthorrhynchus marginatus Payk. T.

» *campestris* Gylh. T.

Tapinotus sellatus F. W.

Phytobius comari Herbst T.

Balaninus betulae Steph. T.

Apion compactum Desbr. T.

» *viciae* Payk. T.

ED. EVERTS.