

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

Nº. 57.

DEEL III.

1 Januari 1911.

INHOUD: H. A. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, 1910: Een jaar zonder wespen. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen XXXV. — A. J. BUIS, *Mesogona Oxalina* Hbn., eene nieuwe vlindersoort (Noctuide) voor Nederland. — Dr. C. L. REUVENS, Boekaankondiging. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek.

1910: Een jaar zonder wespen.

Naar aanleiding der mededeeling van Dr. J. Th. Oudemans onder bovenstaand opschrift, voorkomende in de Entomologische Berichten van Nov. l.l., wil ik mijne waarnemingen daaromtrent bij deze mededeelen.

Reeds vroeg in 't voorjaar van 1910 vertoonden zich in mijn tuin zeer veel overwinterde wespen; zij kwamen voor in eene menigte, zooals ik zelden had waargenomen. Het natuurlijk gevolg daarvan was, dat ik een echt wespenjaar voorspelde. Maar Juli kwam en Augustus kwam, maar de wespen (uitgezonderd *Vespa crabro* L., waarover later) bleven zoo goed als geheel weg. Kwamen andere jaren veel wespen de serreen de kamer binnenvliegen, dezen zomer behoorde het tot de zeldzaamheden; ik geloof niet, dat ik meer dan 5 stuks gevangen heb.

Vespa crabro L. kwam meer voor, hoewel ook niet in dien getale als het vorige jaar; toen waren deze wespen 's avonds met smeren bepaald hinderlijk. In 1909 heb ik o. a. 's avonds

op smeer eens eene Noctuine tusschen 5 *Crabro's* van een boom moeten weghalen; dit jaar was 5 het grootste aantal, dat ik op een avond waarnam en daarvan zaten er 3 op één boom. In October trof ik nog een mannetje van *Vespa crabro* in huis aan.

Ook wat de vlinders aangaat, vond ik 1910 een merkwaardig jaar.

Dagvlinders nam ik over het algemeen weinig waar. In Juni was de vangst op smeer, zoowel in Limburg als onder Apeldoorn, beter dan verleden jaar. In Juli begon het te minderen en in Augustus en September kwam onder Apeldoorn bijna geen vlinder meer op smeer voor. Opmerkelijk was het, dat de meest algemeene soorten soms geheel ontbraken en enkele exemplaren van meer zeldzame soorten aangetroffen werden.

Dyschorista suspecta Hb., na 1894 alhier niet meer waargenomen, kwam dit jaar in meerdere exemplaren weder voor.

Agrotis interjecta Hb., sedert 1893 niet meer op smeer gevonden, trof ik ook dit jaar weder aan, al was het dan ook maar in één exemplaar.

Het merkwaardigste is zeker, dat ik geen enkele *Agrotis xanthographa* F. gezien heb, eene soort, die andere jaren tot vervelens toe in Augustus alhier op smeer wordt aangetroffen.

H. A. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL.

Acarologische Aanteekeningen XXXV.

Bryobia pratensis Garman.

Van den heer H. E. EWING te Ithaca, N. Y., ontving ik eene *Bryobia pratensis* Garman. Deze bleek mij, na onderzoek, niet anders te zijn, dan onze zeer gemeene *Bryobia cristata* Dugès.