

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

Nº. 58.

DEEL III.

1 Maart 1911.

INHOUD: C. A. L. SMITS VAN BURGST, Eerste lijst van Hymenoptera, in Nederland gevangen of uit andere insecten gekweekt, hoofdzakelijk behorend tot de Microhymenoptera en wel tot de groepen, vereenigd onder den naam van „sluipwespen”. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aantekeningen XXXVI. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek.

**EERSTE LIJST** van **Hymenoptera** in Nederland gevangen of uit andere insecten gekweekt, hoofdzakelijk behorend tot de »Microhymenoptera« en wel tot de groepen, vereenigd onder den naam van »Sluipwespen«.

De hieronder genoemde soorten zijn gedetermineerd door Prof. Dr. O. SCHMIEDEKNECHT te Blankenburg i/Thür.; de exemplaren bevinden zich in mijne collectie. De **Ichneumoniden**, eveneens tot de sluipwespen behorend, zullen in het T. v. Ent. in afzonderlijke lijsten verschijnen.

Fam. **CYNIPIDAE.**

Subfam. **Eucoilinae.**

*Glaucaspis microptera* Hart. ♀, Everts, den Haag, 9.

Subfam. **Tigitinae.**

*Tigites consobrinus* Grv. ♀, Everts, den Haag, 9.

Fam. **PROCTOTRUPIDAE.**Subfam. **Ceraphroninae.**

*Megaspilus* (Conostigmus) *curtipennis* Kieffer ♂ ♀, Everts, den Haag, 8.

*Megaspilus* (Conostigmus) *thoracicus* Nees ♂, Everts, den Haag, 10.

*Megaspilus* (Conostigmus) *cursitans* Nees ♂. Everts, den Haag, 10.  
» » *mujipes* Nees ♂. Everts, den Haag, 8.

Subfam. **Proctotrupinae.**

*Cryptoserphus* (Proctotrupes) *parvulus* Nees ♀, Everts, den Haag, 9.

*Phaenoserphus* (Proctotrupes) *pallipes* Hal. ♀. omg. v. Breda.  
» » *riator* Hal. ♂, den Haag, 9.

*Ervallonyx* (Proctotrupes) *ligatus* Nees ♀, Everts, den Haag, 10.  
» » *subserratus* Kieffer ♀, Everts, den Haag, 10.

Subfam. **Ceraphroninae.**

*Lagynodes nitidiceps* Kieffer ♀, Everts, den Haag, 9.

» *niger* Kieffer ♂, Everts, den Haag, 10.

*Ceraphron longipennis* Kieffer ♂, Everts, den Haag, 10.

Subfam. **Belytinae.**

*Leptorhaptus dolichocerus* Marsh. ♂, Everts, den Haag, 8.

Subfam. **Diapriinae.**

- Paramesius rufipes* Westw. ♀, Everts, den Haag, 9.  
 » *brachypterus* Thoms. ♂, Everts, den Haag, 9.  
*Spilomicrus* spec., Everts, den Haag, 9.  
 » *nigripes* Thoms. ♂, Everts, den Haag, 10.  
*Diapria verticillata* Latr. ♂, Everts, den Haag, 10.  
 » *temicornis* Thoms. ♂, Everts, den Haag, 10.

Subfam. **Platygasterinae.**

- Polygnotus striolatus* Nees ♀, Everts, den Haag, 10.  
*Isorhombus* spec., Everts, den Haag, 9.

Fam. **CHALCIDIDAE.**Subfam. **Toryminae.**

- Torymus longicandatus* Ratz. ♀, omg. v. Breda, uit eikengallen.  
 » *auratus* Fe. ♀, omg. v. Breda.  
*Monodontomerus dentipes* Boh., omgev. v. Breda. 3 ♂♂ en  
 1 ♂ uit het puparium eener parasietylief.

Subfam. **Pteromalinae.**

- ? *Spintherus obscurus* Thoms. ♀, Everts, Rotterdam, uit *Rhizo-*  
*pertha pusilla* F.  
*Meraporus* (*Peridesmia*) *graminicola* Walk. ♀, omg. v. Breda.

Fam. **BRACONIDAE.**Subfam. **Alysiinae.**

- Aspilota nervosa* Hal. ♀, Everts, den Haag, 9.  
 » *fuscicornis* Hal. ♂, Everts, den Haag, 10.

Subfam. **Spathiinae.**

*Spathius evicator* L. ♀, den Haag, 7.

Subfam. **Rogadinae.**

*Rogas circumscriptus* Nees ♀, den Haag, 9.

Subfam. **Cheloninae.**

*Ascogaster rufidens* Westw. ♂, omg. v. Breda.

» *rufipes* Nees ♀, den Haag, 7.

Subfam. **Microgasterinae.**

*Apanteles obscurus* Nees ♀, den Haag, 7.

» *octomarius* Ratz. ♂ ♀, den Haag, 7.

» *adjunctus* Nees ♂, omg. v. Breda.

Subfam. **Meteorinae.**

*Meteorus flaviceps* Ratz. ♀, den Haag, 7.

Subfam. **Macrocentrinae.**

*Macrocentrus flavipes* Ratz., omg. v. Breda, 4 ♂ ♂ en 2 ♀ ♀ uit 2 gallen van *Evetria resinella* L.

Subfam. **Opiinae.**

*Opis singularis* Westw. ♂, omg. v. Breda.

Subfam. **Alysiinae.**

*Phaenocarpa conspurcator* Hal. ♂, omg. v. Breda.

*Aphaereta cephalotes* Hal. ♂, omgev. v. Breda.

Subfam. **Dacnusinae.**

*Dacnusa areolaris* Westw. ♂ ♀, omg. v. Breda en den Haag, 8.

Subfam. **Aphidiinae.**

*Aphidius arenae* Hal. ♂, den Haag, 7.

» *rosae* Hal. ♀, den Haag, 7.

» *leucopterus* Hal. ♂, omg. v. Breda.

» *jubarum* Marsh. ♀, Everts, den Haag, 8.

SMITS VAN BURGST.

**Acarologische Aanteekeningen XXXVI.****Heterothrombidium Verdun.**

In dit genus, met *sanremense* Oudms. als type, bracht ik nog de volgende species: *hylodeus* Oudms., *verduni* Oudms. en *polysticum* Oudms., hoewel ik terstond de heterogeniteit ervan bespeurde. Ik splits thans dit genus in drieën: *Hannemania*, *Leeuwenhoekia* en *Heterothrombidium*.

**Hannemania nov. gen.**

J. L. HANNEMAN schreef, 1682, in zijn werk *Miscellania curiosa* ook over den *Acarus siro* == de schurftmijt.

Larva. Schildje breeder dan lang, min of meer 5-hoekig, met spits naar achter; maxillicoxaalharen achter de palpen: type *Heterothrombidium hylodeus* Oudms.

**Leeuwenhoekia nov. gen.**

Behoef ik te zeggen, wie LEEUWENHOEK was? Is het niet