

Subfam. **Dacnusinae.**

Dacnusa areolaris Westw. ♂ ♀, omg. v. Breda en den Haag, 8.

Subfam. **Aphidiinae.**

Aphidius arenae Hal. ♂, den Haag, 7.

» *rosae* Hal. ♀, den Haag, 7.

» *leucopterus* Hal. ♂, omg. v. Breda.

» *jubarum* Marsh. ♀, Everts, den Haag, 8.

SMITS VAN BURGST.

Acarologische Aanteekeningen XXXVI.**Heterothrombidium** Verdun.

In dit genus, met *sauvemeuse* Oudms. als type, bracht ik nog de volgende species: *hylodeus* Oudms., *verduni* Oudms. en *polydiscum* Oudms., hoewel ik terstond de heterogeniteit ervan bespurde. Ik splits thans dit genus in drieën: *Hannemania*, *Leeuwenhoekia* en *Heterothrombidium*.

Hannemania nov. gen.

J. L. HANNEMAN schreef, 1682, in zijn werk *Miscellanea curiosa* ook over den *Acarus siro* = de schurftmijt.

Larva. Schildje breeder dan lang, min of meer 5-hoekig, met spits naar achter; maxillicoxaalharen achter de palpen: type *Heterothrombidium hylodeus* Oudms.

Leeuwenhoekia nov. gen.

Behoef ik te zeggen, wie LEEUWENHOEK was? Is het niet

vreemd, dat geen genus, noch van dieren, noch van planten, naar dezen genialen onderzoeker genoemd werd?

Larva. Schildje breeder dan lang, trapezoidaal, mediaan anterior knopvormig, driehoekig, of op andere wijze verlengd; maxillicoxaalharen achter de palpen; type *Heterothrombidium verduni* Oudms.; hiertoe ook *polydiscum* Oudms. en *jaegerskioeldi* nov. sp.

Heterothrombidium Verdun 1909.

Larva. Schildje langer dan breed; maxillicoxaalharen vóór de palpen; type *Thrombidium (granulatum)* Oudms. non Menge *sanremense* Oudms.

Leenwenhoekia jaegerskioeldi nov. sp.

Larva. Schildje breeder dan lang, maxillicoxaalharen achter de palpen; mediaan driehoekig lapje vóór het schildje aanwezig; mandibels niet door hypostoom overwelfd; vrije vinger der mandibels lang, met 6 tandjes; hypostoom met dunne doorschijnende bladvormige malae internae; palpklauw met extern naaldvormig nevenklauwtje; oogen tegen elkaar aangedrukt; rug met drie dwarsrijen van 14, één van 10, één van 6 en één van 4 haren; alle haren staafvormig en behaard. — Onder steenen, Heluan bij Cairo, Mei 1901, Dr. I. Trägårdh.

Achorolophus sudanensis nov. sp.

Mandibels vóór de basen plotseling vernauwd; galeaharen borstelvormig, terminaal; de drie dorsale palpharen dik, behaard; palptibia intern met borstel; schildje driehoekig, vóór zeer konkaf; de twee zijdelingsche schildharen naast elkander (niet achter elkander), knotsvormig, behaard; lijf met ongeveer 10

langsrijen van 12 tot 20 platte veeren. — Palpgenu ventraal eveneens met behaard haar: palptarsus rolrond, met extern reukhaar, terminaal staafhaar, drie tastharen en twee veertjes; coxae I met behaard haar: coxae II en III met platte veer; tusschen coxae I en tusschen coxae II een paar behaarde haren; alle overige buikharen zijn platte veeren. — Op *Adesmia dilatata* Kl. (*Tenebrionidae*), Khartoem, Sudan, 1901, Dr. I. Trägårdh.

A. C. OUDEMANS.

BIBLIOTHEEK.

G e s c h e n k e n.

Van de Schrijvers:

Speiser, P., Diptera, Cyclorapha. 1910. 4°. Extr. W. Erg. Schw. Exp.

Loman, J. C. C., Opiliones. 1910. 8°. Extr. F. S. W. Austr., T. III.

Hofeneder, K., *Stichotrema* n. g. *Dalla Torreaum* n. sp. Eine in einer Orthoptere lebende Strepsiptere. Met fig. 8°.

Piepers, M. C., Anlässlich der »Beobachtungen über den Polymorphismus von *Papilio Memnon* L. von E. Jacobson« 8°. Extr. Tijdschr. v. Ent., T. LIII, 1910.

Haverhorst, H., Over de staartspitsen onzer Heterocera-poppen.

Met pln. 8°. Extr. Tijdschr. v. Ent., T. LIII, 1910.

Veth, H., Remarques coléoptérologiques. 8°. Extr. Tijdschr. v. Ent., T. LIII.

Van Dr. Ed. Everts:

Entomologische Blätter. Jhrg. VI. 1910.

Van Dr. C. L. Reuvens:

Deutsche Entomologische National-Bibliothek. Jhrg. I. (Afl. 7-12).

Wordt door ruil voortgezet.