

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING,

N^o. 60.

DEEL III.

1 Juli 1911.

INHOUD: Dr. J. TH. OUDEMANS, Zuid-Limburgsche
Lepidoptera. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek.

Zuid-Limburgsche Lepidoptera.

Hoewel de excursie der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, op 18 Juni j.l. in de omgeving van Epen gehouden, den verzamelaars van Lepidoptera geene reden tot groote tevredenheid gaf, heb ik den indruk ontvangen, dat de minder gunstige weersomstandigheden daarvan wel in hoofdzaak de schuld dragen en het terrein rondom Epen zonder twijfel veel goeds herbergt. De geologische gesteldheid doet dit trouwens zeker verwachten.

Ten bewijze hiervan zij vermeld, dat kort vóór en gedurende de excursie de volgende zeldzame Lepidoptera aldaar werden aangetroffen :

Parasemia (Nemeophila) plantaginis L., Epen, 27 Mei 1911,

Thyris fenestrella Sc., Epen, 29 Mei 1911,

Zanclognatha tarsicrinalis Knoch, Epen, 18 Juni 1911.

Madopa salicalis Schiff., Epen, 18 Juni 1911.

De eerste twee soorten kwamen in mijn bezit door de welwillendheid van een Amsterdamsch verzamelaar, den heer van der Beek, die in Mei eenige dagen te Epen doorbracht.

Parasemia plantaginis is reeds vroeger ter zelfder plaatse waargenomen; in mijne verzameling bezit ik een paartje, in

Juni 1905 door den heer J. G. Zöllner te Epen gevangen. Overigens vind ik alleen den Pietersberg bij Maastricht als vindplaats vermeld. De opgave in de »Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland« Dl. 1, p. 7. »Gelderland« en Dl. 1, p. 235, »Dierensche bosch«, schijnen aan gegronnen twijfel onderhevig geweest te zijn, daar Snellen, *Macrolepidoptera* p. 162, deze niet alleen niet overneemt, doch daarentegen speciaal vermeldt »Niet in de Bouwstoffen«.

Thyris fenestrella is eene zeer belangrijke vondst. Wij kennen geene andere vindplaatsen in ons land dan St. Pieter en Grousveld, beide opgaven van wijlen Mr. A. H. Maurissen, zie Tijdschr. v. Entom. Dl. 25, p. CX. Daar zijne collectie na zijn dood naar België verhuisde, waren daarmede de bewuste exemplaren uit ons land verdwenen.

Zanclognatha tarsicrinalis was tot nog toe alleen gevonden te Houthem, te Valkenburg en te Laag-Soeren.

Madopa salicalis werd tot nog toe slechts eens in ons land aangetroffen en wel door den heer Snellen op de excursie der Ned. Entom. Ver. te Venlo op 8 Juni 1894, zie Tijdschr. v. Entom. Dl. 38, p. LI en Dl. 40, p. 308, Pl. 12, fig. 4. De heer Schuyt was zoo gelukkig thans een exemplaar te bemachtigen en zoo welwillend het mij aan te bieden.

Ten slotte wil ik nog vermelden, dat ik den dag na de excursie, dus 19 Juni, in 't Geuldal bij Valkenburg een exemplaar ving van *Larentia testaceata* Don., tot nog toe alleen uit Zuid-Limburg bekend. Deze soort werd in Juni 1909 ook te Epen aangetroffen.

J. TH. OUDEMANS.
