

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

Nº. 62.

DEEL III. 1 November 1911.

INHOUD: Jhr. Dr. ED. EVERTS, Opgave van de meer zeldzame en nieuw ontdekte Coleoptera, verzameld gedurende de excursies in de omstreken van Meerssen, Valkenburg, Gulpen en Epen (Zuid-Limburg), Juni 1911. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen XXXVIII. — Dr. D. MAC GILLAVRY, Rhynchota, verzameld in 1911 door Dr. H. J. Veth in Algeria en door C. A. L. Smits van Burgst in Tunesia. — Dr. D. MAC GILLAVRY, Merkwaardige coincidentie. — P. VAN DER GOOT, Voorloopige naamlijst van inlandsche Aphididae. — C. A. L. SMITS VAN BURGST, Zeldzame sluipwespen. — J. TH. OUDEMANS, Stephanus serrator F. in Nederland. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek. — Bladvulling.

Opgave van de meer zeldzame en nieuw ontdekte Coleoptera,
verzameld gedurende de Excursies in de omstreken van
Meerssen, Valkenburg, Gulpen en Epen
(Zuid-Limburg), Juni 1911.

Bembidion Stephensi Crotch

Aleochara ruficornis Grav.

Falagria nigra Grav.

Brachida exigua Heer, Faun. nov. sp., Meerssen.

Euryusa optabilis Heer

Scopaeus cognatus Muls. & Rey.

Trogophloeus despectus Baudi



- Xylodromus testaceus* Er.
Anthobium rectangulum Fauv.
Megarthrus affinis Miller, Faun. nov. sp. Valkenburg; was ook reeds bij Maastricht gevangen door Pater H. Schmitz.
Cephennium thoracicum Müll.
Anisotoma obesa Schmidt.
 » *calcarata* Er.
Meligethes rufipes Gylh.
 » *lumbaris* St.
 » *incanus* St.
Cryptophagus setulosus St.
Cis oblongus Mellie
Coninomus constrictus Gylh.
Alexia pilosa Panz.
Synecalypta spinosa Rossi
Esolus parallelepipedus Müll. Faun. nov. sp. Gulpen.
Riolus cupreus Müll.
 » *subviolaceus* Mls.
Sinodendron cylindricum L.
Agrilus pratensis Ratz.
Thelephorus violaceus Payk.
Malthodes mysticus Rsw. var.
 » *obscuriusculus* Dietr.
 » *nigellus* Rsw. Faun. nov. sp. Epen.
Sphinginus lobatus Oliv.
Mordellistena abdominalis F.
 » *brericauda* Boh.
Chrysomela fuliginosa Ol. forma *galii* Weise.
Crepidodera rufipes F.
 » *nitidula* L.
Epitrix atropae Foudr. type en ab. c. *nigritula* Weise en *4-maculata* Weise Faun. nov. sp. Epen. Was aldaar reeds gevangen door den Heer Zöllner.

- Mantura rustica* L. ab. c.
 » *suturalis* Weise.
Sitona cambricus Steph.
Orchestes rufitarsis Germ. Faun. nov. sp. Epen.
Anthonomus inversus Bedel.
 » subsp. *rosinae* Des Gozis
Magdalis nitida Gylh. Faun. nov. sp. Vermoedelijk Epen.
Rhytidosomus globulus Hrbst.
Acallis roboris Curtis
 » *turbatus* Boh.
 » *ptinoides* Mrsh.
Apion columbinum Germ. Faun. nov. sp. Epen.
-

Acarologische Aanteekeningen XXXVIII.

NAMEN VOOR LICHAAMSAFDEELINGEN.

Ray Lankester, Benham en Miss Beck (1885) gaven aan de mond- en pooten-dragende afdeeling van *Limulus* en *Scorpio* den naam van *Prosooma* (met inbegrip van den primairen kop).

Börner (1904) stelde voor alle overige segmenten tezamen der *Arachnoidea* den naam *Opiosthosoma* voor.

Reuter (1909) accepteert deze benamingen, doch daar Acari nog andere lichaamsafdeelingen vertoonen, stelt hij ook de volgende benamingen voor: voor de afdeeling met mondledematen: *Gnathosoma*, voor de afdeeling met mondledematen en twee paar pooten: *Proterosoma*; voor de overige segmenten te zamen *Hysterosoma*.

Dikwijls zijn achter het Gnathosoma alle segmenten saamgegroeid (*Thrombidiidae*); ook is soms een afdeeling met de eerste twee pootparen scherp begrensd (*Tyroglyphidae*, *Tarso-*