

zoals gewoonlijk, doch een onregelmatig veelstralige ster; zij zijn omgeven door de zes kleinere, onderling even groote zuignappen. Het supra-unguinaal haar der pooten I en II is een troffelvormig kleefhaar, dat der pooten III een saucijsvormig blaasje, dat der pooten IV een lange stijve borstel. — Eén exemplaar op een Blattide met hard abdomen; Banjoe-wangi, Java, 1910; Dr. D. Mac Gillavry.

A. C. OUDEMANS.

Rhynchota verzameld in 1911 door Dr. H. J. Veth in Algeria en door C. A. L. Smits van Burgst in Tunesia.

HETEROPTERA.

Pentatomidae.

Psacasta cerinthe Ham R'hira.

Graphosoma lineatum L. var. *flavipes* Am. Tlemcen.

Brachypelta aterrima Fst. Tunis.

Sehirus maculipes M. R. Ham R'hira.

Crocistethus Waltii Fieb. Tunis.

Sciocoris maculatus Fieb. Blida, Ham R'hira. Het laatste exemplaar, evenals een der exemplaren van Blida, zijn mischien *Sc. assimilis* Fieb.

Dyroderes marginatus F. Ham R'hira.

Aelia acuminata L. Blida.

Staria lunata Hahn Ham R'hira.

Dalleria pusilla H. S. var. *consimilis* Costa Ham R'hira.

Eysarcoris melanocephalus F. Tlemcen.

Peribalus distinctus Fieb. Ham R'hira.

Carpocoris baccarum L. Ham. R'hira. Tunis.

» *verbasci* de G. Ham R'hira, Tunis.

Piezodorus incarnatus Germ. var. *alliaceus* Germ. Ham R'hira.

Holcogaster jibulata Germ. Ham R'hira.

Strachia decorata H. S. Mascara, Biskra, Tunis.

Coreidae.

Centrocarenus spiniger F. Tunis.

Verlusia rhombea L. var. *sinuata* Fieb. Blida, Tunis.

» *sulcicornis* F. Tunis.

Gonocerus insidiator F. Ham R'hira.

Ceraleptus gracilicornis H. S. Ham R'hira.

Loxocnemis dentator F. Tunis.

Coreus pilicornis Burm. Ham R'hira, Tunis.

Strobilotoma typhaecornis F. Ham R'hira, Blida.

Micrelytra fassularum Rossi Blida.

Camptopus lateralis Germ. Ham R'hira, Biskra, Tunis.

Stenocephalus agilis Scop. Biskra, Tunis.

Corisus capitatus F. Blida.

» *tigrinus* Schil. Biskra.

Lygaeidae.

Lygaeus militaris F. Biskra, El Kantara, Figuig, Tunis.

» *punctatoguttatus* F. var. Biskra, Tunis.

Caenocoris nerii Germ. Biskra.

Orsillus Reyi Put. Ham R'hira.

Ischuorhynchus (Kleidocerus) geminatus Fieb. Ham R'hira.

Orycaenus lavaterae F. Tunis.

» *hyalinipennis* Costa var. *antennis totis nigris*
Ham R'hira.

Proderus suberythropterus Costa Biskra.

? » *amabilis* Put. Biskra.

? *Rhyparochromus hirsutus* Biskra.

Hyalochilus oratulus Costa Tlemcen.

Beosus luscus F. var. *sphragidimum* Am. Blida, Ham R'hira.

Scolopostethus decoratus Hahn Blida.

Pyrrhocoris apterus L. Tunis.

Tingitidae.

Monanthia (Tropidochila) maculata H. S. Biskra.

» *Woljji* Fieb. Blida. Ham R'hira.

Phymatidae.

Phymata moustrosa F. Ham R'hira,

Reduviidae.

Harpactor erythropus L. Ham R'hira.

Nabis latirentis Boh. (forma macropt.) Ham R'hira.

Capsidae.

Calocoris rubrinervis H. S. Tunis.

Macrotylus nigricornis Fieb. Tunis.

HOMOPTERA.**Fulgoridae.**

Hysteropterum reticulatum H. S. Alger.

D. MAC GILLAVRY.

Merkwaardige coincidentie.

Op de laatste Wintervergadering werd door mij medegedeeld de vondst van *Nabis lineatus* Dahlb. in ons land, van Amsterdam en uit het moeras bij den Plasmolen.

In het 1910 verschenen Supplement op den Catalogus »der deutschen Wanzen« van Th. Hüeber wordt deze soort eveneens als nieuw voor de duitsche fauna vermeld en wel van Sleeswijk-Holstein en verschillende plaatsen van het Rijnland. Een dier plaatsen is het »Kranenburger Venn bei Kleve«. Nu vermoed