

»Zwetschenbanne bei Gumperda in Thüringen. Das Thier ist »nachgewiesen aus Deutschland, Frankreich, Schweiz, Oesterreich und Ungarn; überall höchst selten«.

SMITS VAN BURGST.

### Stephanus serrator F. in Nederland.

Dit merkwaardig Hymenopteron werd in 1908 en in 1909, telkens in de maand Juni, eveneens te Epen (L.) in meerdere exemplaren aangetroffen door den heer W. H. J. van der Beek, die zoo welwillend was, mij voorwerpen van beide sexen aan te bieden. In 1911 vond de heer van der Beek terzelfder plaatse einde Mei één enkel exemplaar. Deze vangsten waren nog niet vermeld, doch mogen dit thans worden in aansluiting aan de bovenstaande mededeeling van den heer Smits van Burgst.

J. TH. OUDEMANS.

### BIBLIOTHEEK.

#### Aankopen.

Nuttall, G. H. F., C. Warburton, W. F. Coopex and L. E. Robinson, Ticks. A Monograph of the Ixodoidea. Cambridge 1908—1911. Afl. 1—2 en Suppt. (Bibliography). Met pln. en fig. 8°.

Distant, W. L., Rhynchota. London 1910. T. V, met fig. 8°.

Zie Groep H, Blanford, Fauna of British India.

Arrow, G. J., Coleoptera Lamellicornia (Cetoniinae and Dynastinae). London 1910, Met fig. 8°.

Zie Groep H, Blanford, Fauna of British India.