

Triosa galii Först. — (Uit Tijdschr. v. Ent. dl. V. pag. 88, aant. v. Six).

Triosa maura Först. (*Tr. helvetina* M. D.). — (Uit Tijdschr. v. Ent. dl. V. p. 88, aant. v. Six).

Triosa urticae L. (*Ps. eupoda* Htg., *Tr. forcipata* Först., *Tr. protensa* Först., *Tr. crassinervis* Först., *Tr. bicolor* M. D., *Cnidopsylla* Amyot.). — ♀♀ en ♂♂; op *Urtica dioica*. — Wageningen (10/7 '11); coll. Mac Gill.: Haamstede (1/7 11).

Amsterdam, Juli 1912.

P. VAN DER GOOT.

Naamlijst van inlandsche Coccidae.

Evenals *Aphiden* en *Psylliden*, zijn ook de *Cocciden* in onze entomologische litteratuur stiefmoederlijk behandeld geworden.

Van deze laatste groep bestaat slechts één naamlijst, n.l. die van DE GRAAF c.s. in 't Tijdschrift voor Entomologie dl. V.

In den lateren tijd worden de *Cocciden* in onze litteratuur slechts weinig genoemd; een vrij groot aantal, waaronder meerdere faun. nov. spec., zijn echter successievelijk vermeld in de jaarverslagen van het Instituut W. C. SCHOLTEN en in die van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

De meeste der in deze laatstgenoemde verslagen vermelde soorten heb ik zelf kunnen determineeren; de enkele soorten, die als inlandsch vermeld staan, doch die ik zelf niet heb kunnen nagaan, heb ik in deze lijst met een * opgenomen. Een opgave der vaak zeer talrijke synoniemen heb ik hier achterwege gelaten; hiervoor zij o. a. verwezen naar het bekende werk van NEWSTEAD (*Monograph of the Coccidae of the British Isles*. 1902).

In deze lijst heb ik niet alleen opgenomen de verschillende soorten, welke hier te lande in de open lucht voorkomen, maar

ook die, welke in kassen zijn aangetroffen; dit laatste wordt er dan echter steeds bij vermeld. Als voedsterplanten vermeld ik slechts die, welke hier te lande tot nu toe als zoodanig zijn waargenomen.

De hier gebruikte nomenclatuur tenslotte is hoofdzakelijk aan NEWSTEAD ontleend, behoudens een aantal wijzigingen, die hierin in lateren tijd zijn aangebracht door bekende *Cocciden*-onderzoekers als Dr. L. LINDINGER en Dr. P. MARCHALL.

Het aantal der in onderstaande lijst vermelde soorten bedraagt 38; hiervan komen 21 in de open lucht voor.

Genus *Aspidiotus*.

Aspidiotus camelliae Sign. — ♀♀; op *Myrte* sp. In kassen. — Wageningen.

Aspidiotus hederæ (Vallot) Sign. — ♀♀; op *Phoenix*, *Kentia*, *Mimosa*, etc. Algemeen in kassen. — Bussum, Nijmegen, Wageningen, etc.

Aspidiotus ostræiformis Curtis. — ♀♀; op appel, peer. — Aalsmeer, Dedemsvaart, Heibloem (L.), Veur, Wageningen.

**Aspidiotus rapax* Comst. — ♀♀; op *Laurus nobilis*. In kassen. — Wageningen (1908). — (Vermeld in LINDINGER, Beiträge zur Kenntniss der Schildläuse und ihrer Verbreitung. II. Zeitschr. f. wiss. Ins. biologie 1911).

Aspidiotus zonatus Frauenfeld. — ♀♀ en ♂♂; op *Quercus* sp. — Wageningen (1911), De Bildt, Gorsel.

Genus *Chrysomphalus*.

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) Leon. — ♀♀; op *Coelogyne* sp. In kassen. — Wageningen.

Chrysomphalus personatus Comst. — ♀♀; op *Bromeliacae* sp. In kassen. — Wageningen.

Genus *Diaspis*.

Diaspis cucti Comst. — ♀♀; op *Cactus* sp. In kassen. — Wageningen.

Diaspis fallax Horvath. — ♀♀ en ♂♂; op peer. — Baambrugge (N.-H.). — (Uit Ritz, Bos. Ziekten der Ooftboomen IV).

Diaspis visci (Schrk.) Löw. (= *D. carueli* Targ.). — ♀♀ en ♂♂; op *Juniperus canadensis*. — Aalsmeer.

Genus *Aulacaspis*.

Aulacaspis rosae (Bouché) Cockerell. — ♀♀; op *Rosa* sp. — Middelburg.

Genus *Chionaspis*.

Chionaspis salicis (L.) Sign. — ♀♀ en ♂♂; op *Alnus*, *Fracinus*, *Paeonia*, *Populus*, *Tilia*, *Salix*. — Boskoop, Bussum, Doorwerth, Wageningen, Wijk aan Zee, etc. Algemeen.

Genus *Hemichionaspis*.

Hemichionaspis aspidistrae (Sign.) Cockerell. — ♀♀; op onbekende kasplant. — Wageningen.

Genus *Lepidosaphes* (= *Mytilaspis*).

Lepidosaphes ulmi Bouché (= *Myt. pomorum*). — ♀♀ en ♂♂; op *Betula alba*, *Buxus sempervirens*, *Cornus* sp., *Crataegus* sp., *Fagus purpurea*, *Juglans regia*, *Malus* sp., *Pirus* sp., *Prunus cerasus*, *Sorbus aucuparia*. — Aalsmeer, Boskoop, Oudenbosch, Wageningen, etc. Algemeen.

Lepidosaphes pinnaeformis Bouché. — ♀♀; op *Vanda* sp. In kassen. — Wageningen.

Genus *I s c h n a s p i s*.

Ischnaspis filiformis Dougl. — ♀♀. Op *Elaëus* sp. In kassen.
— Amsterdam.

Genus *L e c a n i u m*.

Lecanium bituberculatum Targ. Tozz. — ♀♀. Op *Crataegus oxyacantha*, *Malus* sp., *Pirus malus*, *Prunus spinosus*. — Boskoop, Haarlem, Wageningen.

Lecanium ciliatum Dougl. — ♀♀. Op *Betula alba*. — Gorsel, 20/7 '12.

Lecanium corni Bouché. — ♀♀. Op *Buxus sempervirens*, *Persica vulgaris*, *Ribes grossularia*, *R. nigrum*, *R. rubrum*, *R. sanguineum*, *Robinia pseudacacia*, *Rubus idaeus*, *Viburnum opulus*. — Boskoop, Herveld, Oudebosch, 't Westland, Wageningen, etc. Algemeen in de open lucht, ook in kassen (op perzik).

Lecanium haemisphaericum Targ. Tozz. — ♀♀. Op *Coffea* sp., *Pteris* sp. etc. Algemeen in kassen op div. planten. — Wageningen, Amsterdam, etc.

Lecanium hesperidum L. — ♀♀. Op *Bourvardia*, *Citrus*, *Kentia*, *Laurus nobilis*, etc. Algemeen in kassen op div. planten. — Aalsmeer, Bussum, Wageningen.

Lecanium oleae Bern. — ♀♀. Op? In kassen. — Wageningen.

**Lecanium perforatum* Newst. — ♀♀. Op *Caryota majestica*. In kassen. — (Uit Jaarverslag Instituut voor Phytopathologie 1908).

Genus *P h y s o k e r m e s*.

Physokermes coryli L. (= *Lec. capreae*). — ♀♀ en ♂♂. Op *Acer pseudoplatanus*, *Corylus avellana*, *Crataegus oxyacantha*, *Pirus malus*, *Prunus cerasus*, *Prunus domestica*, *Prunus padus*, *Prunus spinosus*, *Rosa* sp., *Tilia* sp., *Ulmus montana*. — Amsterdam,

Oudenbosch, Opheusden, Wageningen, Zetten, etc. Algemeen.

Physokermes piceae (Schrk.) Fern. — ♀♀. Op *Picea excelsa*.
Gorsel (Gld.) 23/7 '12.

Genus *Pulvinaria*.

Pulvinaria betulae Sign. — ♀♀. Op *Alnus* sp., *Betula alba*,
Ribes grossularia, *Ribes nigrum*, *Salix* sp. — Amsterdam, Gemert,
Leuvenum, Rhenen, Wageningen, etc. Algemeen verbreid.

Pulvinaria floccifera Westw. — ♀♀. Op *Camellia japonica*,
Taxus baccata. In koude kassen, ook in de open lucht (op
Taxus). — Boskoop, Wageningen.

Genus *Eriopeltis*.

Eriopeltis festucae Fonse. — ♀♀. Op *Corynephorus canescens*.
— Utrecht '10.

Genus *Asterolecanium*.

Asterolecanium variolosum Ratz. — ♀♀. Op *Quercus* sp. —
Bussum, Gorsel, Wageningen.

Genus *Gossyparia*.

Gossyparia ulmi Sign. — ♀♀; op *Ulmus* sp. — Duivendijke,
Oudenbosch.

Genus *Fonscolombia*.

Fonscolombia fraxini (Kalt.) Cockerell. — ♀♀; op *Fraxinus*
excelsior. — Wageningen 1910.

Genus *Pseudococcus* (= *Dactylopius*).

Pseudococcus citri Risso. — ♀♀ en ♂; op div. kasplanten. Algemeen in kassen. — Amsterdam, Wageningen, etc.

Pseudococcus hybernicus Newst. — ♀♀; op bollen van *Amaryllis* en *Richardia*. In koude kassen. — Voorschoten, Wageningen.

Pseudococcus nipae Mask. — ♀♀; op *Kentia* sp. In kassen. — Amsterdam, Boskoop.

Genus *Eriococcus*.

Eriococcus aceris (Sign.) Cockerell. — ♀♀; op *Fagus sylvatica*. — Apeldoorn 1911, Gorsel 1912.

Genus *Ripersia*.

Ripersia terrestris Newst. — ♀♀; op *Pteris* sp. (wortels). In kassen. — Breda.

Genus *Cryptococcus*.

Cryptococcus fagi Bärenspr. — ♀♀; op *Fagus sylvatica*. Algemeen. — Arnhem, Bussum, Heelsum, Velzen, Wageningen, etc.

Genus *Margarodes*.

**Margarodes polonicus* (L.) Fern. — ♂; voedsterplant onbekend. — Hilversum. — (Uit verslag zomerverg. Ned. Ent. Ver. in Tijdschrift voor Entomologie 1911, bldz. XL).

Amsterdam, Juli 1912.

P. VAN DER GOOT.