

- Stenocephalus neglectus* H. S. Ajaccio.
Corizus capitatus F. Ajaccio.
Macerethus errans F. Bastia, Ile Rousse.
Lygaeus apuanus ROSSI. Vizzavona.
Nysius senecionis SCHILL. Ile Rousse.
Ischnorhynchus germinatus FIEB. Vizzavona.
Rhyparochromus praetextatus H. S. Ile Rousse.
Microtoma atrata GOEZE (*carbouaria* ROSSI). Ajaccio.
Pachymerus (Aphaeus) vulgaris SCHILL. Vizzavona.
Mouanthia (Platychila) cardui L. Ile Rousse.
Aradus lugubris FALL. Vizzavona.
Harpactor erytropus L. Ajaccio.
Calocoris hispanicus GMEL. var. *nemoralis* F. Ajaccio.
 » » » » *hexastigma* REUT. Ile Rousse.
 » » » » *sexpunctata* F. Ile Rousse.
Campybrochis lutescens SCHILL. Vizzavona.
Strongylocoris luridus FALL. Ile Rousse.
 ? *Triphleps niger* WOLFF. Ajaccio.

Amsterdam, 12 September 1912.

D. MAC GILLAVRY.

Voorloopig bericht van eenige merkwaardige vangsten op Terschelling.

Door de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging werd dit jaar een tocht van een week naar Terschelling ondernomen. Voor de verschillende afdeelingen waren leiders aangewezen zoo voor planten, vogels, zeedieren, eencelligen, geologie en insecten. De laatstgenoemde afdeeling was mij ten deel gevallen. Ik heb daarvan gebruik gemaakt, om zooveel mogelijk alles wat insect was te verzamelen en kon een 800 insecten bijeenbrengen. Dit getal over de verschillende orden verdeeld is wel

niet groot, maar mag toch genoemd worden, in aanmerking nemende, dat 1912 over het algemeen een slecht insectenjaar is, dat de tocht in de tweede helft van Augustus gehouden werd en voortdurend koude, regen en wind het vangen bemoeilijkte.

Mijn hoop was vooral gevestigd op de slikken en had ik verwacht op de zeelei een fauna te vinden eenigszins gelijkend op die van Bergen op Zoom. Dit is nu wel wat tegengevallen, maar toch is er wel het een en ander belangrijks bij. Zoo heb ik met volharding de *Statice limonium* L. afgesleept en mocht het mij na drie uur slepen gelukken het eerste exemplaar van *Apion limonii* KIRBY te vinden. Na eenige dagen ving ik nog meerdere exemplaren. Opmerkelijk is, dat ik het dier alleen vond aan den Dellewal, terwijl aan de Grie, waar ook klei is en *Statice* in overvloed, geen een *Apion* gevonden werd. Beide plaatsen heb ik tweemaal onder handen genomen.

Het is zeer interessant, dat deze tot nu toe nog niet uit Duitschland vermelde soort zoo ver Noord-Oostelijk in aantal blijkt voor te komen.

Opmerkelijk was, dat het zeven van het overal aanwezige zeegras (*Zostera marina* L.) niets opleverde; alleen eenige half verdroogde stukken blaaswier brachten eenige *Staphylinen* op. Het interessante is nu, dat, volgens een bericht van Dr. EVERTS, die de determinatie der *Coleoptera* op zich genomen heeft, deze *Staphylinen*, 7 in getal, een uiterst belangwekkende vondst uitmaken. Het blijkt, dat het *Myrmecopora urida* ERICUS. is, een soort noch in Duitschland, noch in België bekend en waarvan GANGLBAUER als vindplaats opgeeft: »Westliches Mitteleuropa, Italien, Dalmatien, an der Meeresküste unter faulenden Algen«.

Dr. VETH ving de soort bij Arcachon. De Terschellingsche vindplaats is even Oostelijk van den Dellewal, dus aan de Zuiderzeekant van het eiland.

Mijn voornemen is, zoodra de verschillende specialiteiten, die de determinatie van het materiaal op zich hebben genomen, hun taak gereed hebben, de complete lijst ter publicatie in de Berichten of in het Tijdschrift aan de Redactie aan te bieden.

Ik kan reeds berichten, dat onder de *Cicadinen*, die voornamelijk in de duinpannen (plakken, zeggen de Terschellingens) gevangen werden, ook reeds een **faunae nova species** door mij gesignaaleerd is, n.l. *Megamelus notulus* GERM.

Amsterdam, September 1912.

D. MAC GILLAVRY.

Ichneumon fusorius L.

Een zeldzaam verschijnsel werd dezen zomer door mij waargenomen tijdens een verblijf op het landgoed »De Buunderkamp« bij Wolfhezen.

Tegen het einde van de maand Juli vertoonden zich eenige avonden achtereen, telkens omstreeks 7 uur, honderden groote sluipwespen, behoorende tot de soort *Ichneumon fusorius*, in een grooten zwerm, fladderende om de kroon van een beukeboom, hier en daar de bladeren bezoekende, welke met den zoeten honingdauw der bladluizen waren bedekt.

Reeds den eersten avond van hun verschijnen nam ik de gelegenheid te baat om in 't bezit te komen van een aantal exemplaren van deze vrij ongewone soort van sluipwesp. Na de dieren eenigen tijd in hunne bewegingen te hebben gadeslagen, begon ik te vangen.

Op een stoel staande, kon ik met het net een takje bereiken, waarvan de bladeren door de sluipwespen druk werden bezocht. Met den eersten slag ving ik er vier te gelijk; bij den tweeden kwamen er drie in 't net en, tegen dat het donker was geworden, was ik in 't bezit gekomen van 24 stuks van deze prach-