Als men meer dan 54 ratten van ouderdom laat sterven, is het geen wonder, dat er v i e r bij zijn met carcinoom, en als men de dieren tevens rondwormziekte bezorgt, dan zullen de zwakke broeders (dus de carcinoom-zieken) licht rondworm-ziek zijn tevens.

Zeer waarschijnlijk is het ook, dat de 4 dieren, die e c h t e k a n k e r vertoonden, reeds die ziekte bij zich droegen vóór ze met *Periplaneta* gevoederd werden. B e w e z e n is dus niets.

Amsterdam, 18/2 1913. MAC GILLAVRY.

---

## Insecta en Poliomyelitis.

Aan de Nieuwe Rotterdammer Courant van den 3$^{den}$ Maart ontleenen wij het volgende ook voor Entomologen belangrijke bericht.

Wederom worden uitkomsten van onderzoekingen medegedeeld, waaruit blijkt, dat verschillende soorten van insecten de poliomyelitis kunnen overbrengen.

Howard en Clare berichten in het Journal of exp. medicine, dat voortgezette onderzoekingen hun hebben geleerd, dat de gewone vlieg de smetstof kan overbrengen en gedurende ettelijke dagen in volle virulentie op de vleugels kan bewaren, maar slechts enkele uren in haar darmkanaal. De wandluis kan de smetstof 7 dagen met zich omdragen en menschen besmetten; daarentegen bleek uit hunne proeven niet, dat de muggen en de vlooien als smetstofoverbrengers moeten worden beschouwd. (Tijds. v. Soc. Hyg.)

Amsterdam. D. MAC GILLAVRY.

---