

- Tanytus punctatus* F.
 » *nebulosus* Meig.
 » *melanops* Wied.
Corethra pallida F.
 » *culiciformis* Deg.
Rhipidia maculata Meig.
Ula pilosa Schumm.
 **Molophilus bifilatus* Verr. Fn. n. sp.
Empeda nubila Schumm.
Anthalia rostrata Zett.
Sapromyza frontalis Löw
Thryptocera crassicornis Meig.

J. C. H. DE MEIJERE.

Cicadologische Aanteekeningen II.

- *Cixius pilosus* Cl. — Crataegus.
 Utrecht — Mei. (R. Dammerman).
- *Cixius nervosus* L. —
 Arnhem — Aug.
- *Aphrophora alni* Fall. — Salix.
 Arnhem — Sept.
- *Aphrophora salicis* de Geer. — Salix.
 Arnhem — Juni. (K. Dammerman).
- *Idiocerus adustus* H.-Sch. — Salix.
 Arnhem — Juli.
- *Idiocerus populi* L. — Populus.
 Arnhem — Aug.

○ *Agallia puncticeps* Germ.

Duno — Juli.

○ *Agallia venosa* Fall. —

Arnhem — Juli. Sept. Nov.

Deze soort was hier te lande slechts tot in Sept. waargenomen. Melichar schrijft: im Juni bis September (Löw). Zeer eigenaardig komt mij daardoor de vangst voor van een 10-tal ♂♂ en ♀♀ den 9^{en} Nov. — gesleept bij koud, doch zonnig weer, langs een op 't Z. liggende weghelling.

✓ ○ *Euacanthus interruptus* L. — Salix; in weiden.

Duno — Juli.

Arnhem — 15 Sept.

(Melich.: Juni — Aug.).

✓ ○ *Doratura stylata* Bohem. — Langs wegranden op droge plaatsen.

Arnhem — Aug.

○ *Deltocephalus pulicaris* Fall. —

Arnhem — Aug. Sept. 9 Nov.

(Melich.: Juli bis October).

○* *Cicadula fasciifrons* Stål. — Faun. nov. sp.

Arnhem — Sept.

Van deze soort ving ik twee ♂♂, op 10 en 14 Sept. Als vindplaatsen zijn mij tot dusver alleen bekend: Sithka (Fieber Katalog 1072); Böhmen (bei Pilsen); Thüringen (Mel.).

○ *Chlorita flavescens* Dougl. — Langs aardappelvelden zeer talrijk waargenomen.

Arnhem: Juni. Juli. Aug. Sept. Nov.

Merkwaardig is de vangst van een 12-tal ♂♂ en ♀♀ op den 15^{en} Nov.; gesleept uit Calluna en mossen onder beuken.

○ *Kybos smaragdulus* Fall. —

Den Haag — Sept. (v. d. Weele).

Arnhem — Sept. op Salix (R. Dammerman).

○ *Eupteryx vittata* L. — Houdt zich bij voorkeur op tusschen gras e. d. op vochtige plaatsen.

Arnhem — Sept.

○ *Eupteryx pulchella* Fall. — Quercus.

Arnhem — Aug.

Van deze soort komen tweeërlei vormen voor, één met gele en één met fraai rose grondkleur. De teekening der voorvleugels herinnert aan die eener *Lithocelletis*, maar zonder dat het daarbij tot eenige gelijkenis komt.

○ *Eupteryx aurata* L. —

Den 25^{en} Nov. nog één ♂, levendig en wel.

(Mel.: Juni bis September).

○ *Typhlocyba ulmi* L. — Ulmus.

Arnhem — Aug.

C. J. H. BIERMAN JR.

Vlinderfauna van Zutphen.

Het komt mij van genoegzaam belang voor, het door mij o. m. nabij Zutphen waarnemen van de volgende soorten te vermelden, sinds ik aldaar in 1901 ben komen wonen :

Acrionicta strigosa F.; 15—7—04, op stroop.