

Merkwaardig is de vangst van een 12-tal ♂♂ en ♀♀ op den 15^{en} Nov.; gesleept uit Calluna en mossen onder beuken.

○ *Kybos smaragdulus* Fall. —

Den Haag — Sept. (v. d. Weele).

Arnhem — Sept. op Salix (R. Dammerman).

○ *Eupteryx vittata* L. — Houdt zich bij voorkeur op tusschen gras e. d. op vochtige plaatsen.

Arnhem — Sept.

○ *Eupteryx pulchella* Fall. — Quercus.

Arnhem — Aug.

Van deze soort komen tweeërlei vormen voor, één met gele en één met fraai rose grondkleur. De teekening der voorvleugels herinnert aan die eener *Lithocelletis*, maar zonder dat het daarbij tot eenige gelijkenis komt.

○ *Eupteryx aurata* L. —

Den 25^{en} Nov. nog één ♂, levendig en wel.

(Mel.: Juni bis September).

○ *Typhlocyba ulmi* L. — Ulmus.

Arnhem — Aug.

C. J. H. BIERMAN JR.

Vlinderfauna van Zutphen.

Het komt mij van genoegzaam belang voor, het door mij o. m. nabij Zutphen waarnemen van de volgende soorten te vermelden, sinds ik aldaar in 1901 ben komen wonen:

Acrionicta strigosa F.; 15—7—04, op stroop.

Taeniocampa populeti Tr.; 24—3—05, op stroop.

Orrhodia vau-punctatum Esp.; 10—11—05, op stroop; ook eenmaal een ♂ in het voorjaar, 24—3—05.

Toxocampa pastinum Tr.

Catocala sponsa L.

Biston hispidaria F.

M. CALAND.
