

**Coleoptera, bij Putten op de Veluwe in bierpotten
gevangen, II.**

Op dezelfde wijze als beschreven werd in Ent. Ber., Dl. I, p. 201—203, werden door Dr. J. Th. Oudemans in 1905 op het landgoed Schovenhorst te Putten op de Veluwe de volgende Coleoptera in bierpotten gevangen, ten deele in Mei, doch in hoofdzaak in Augustus.

Carabus catenulatus Scop. 5 ex.

» *nemoralis* Müll. 2 ex.

Cychrus rostratus L. 8 ex.

Notiophilus biguttatus F. 3 ex.

Calathus erratus Sahlb. 4 ex.

» *micropterus* Dfts. 4 ex.

» *piceus* Marsh. 37 ex.

Pterostichus coerulescens L. 1 ex.

» *oblongopunctatus* F. 2 ex.

» *niger* Schall. 2 ex.

» *madidus* F. var. *concinus* St. 5 ex.

Abax parallelus Dfts. 4 ex.

» *ater* Villers 47 ex.

Amara aenea de G. 1 ex.

» *praetermissa* Sahlb. 1 ex.

» *fulva* de G. 1 ex.

» *consularis* Dfts. 1 ex.

Harpalus latus L. 1 ex.

» *tardus* Panz. 1 ex.

Atheta Spec. 25 ex.

Orypoda alternans Gr. 2 ex.

Bolitochara lunulata Payk. 2 ex.

Autalia ricularis Grav. 3 ex.

Tachinus rujipes de G. 1 ex.

- Quedius lateralis* Grav. 4 ex.
 » *mesomelinus* Mrsh. 1 ex.
Staphylinus brunripes F. 2 ex.
 » *compressus* Marsh. 7 ex.
Philonthus chaldeus Steph. 1 ex.
Xantholinus linearis Oliv. 1 ex.
 » *punctulatus* Payk. 1 ex.
Oxytelus laqueatus Marsh. 1 ex.
 » *tetracarinatus* Block. 11 ex.
Platystethus arenarius Fourcr. 1 ex.
Homalium rifulare Payk. ± 350 ex.
 » *oxyacanthae* Grav. ± 200 ex.
Lathrinaeum unicolor Mrsh. 1 ex.
 » *atrocephalum* Gylh. 1 ex.
Megarthus depressus Payk. 3 ex.
Trichopteryx grandicollis Mannh. 2 ex.
Hister succicola Thoms. 4 ex.
Oonthophilus sulcatus Ev. 1 ex.
Epuraea obsoleta F. 33 ex.
 » *pusilla* Ill. 11 ex.
Soronia punctatissima ♀ Ill. 1 ex.
Pityophagus ferrugineus L. 1 ex.
Rhizophagus depressus F. 5 ex.
Enicmus transversus Oliv. 1 ex.
Byrrhus pustulatus Forst. 1 ex.
Cercyon lateralis Mrsh. 2 ex.
 » *melanocephalus* L. 1 ex.
 » *pygmaeus* Ill. ab. c. *conspureatus* St. 1 ex.
Oxyomus sylvestris Scop. 4 ex.
Geotrupes sylvaticus Panz. 1 ex.
Melanotus rufipes Hrbst. 1 ex.
Corymbites aeneus L. 1 ex.
Dolopius marginatus L. 1 ex.

Nalassus laevioctostriatus Goeze. 1 ex.

Gonioctena olivacea Forst. 1 ex.

Crepidodera ferruginea Scop. 2 ex.

Otiorrhynchus raucus F. 2 ex.

Strophosomus coryli F. 2 ex.

» *rufipes* Steph. 10 ex.

Sitona hispidulus F. 1 ex.

Orthochaetes setiger Beck 1 ex.

Apion flavipes Payk. 2 ex.

» *virens* Herbst 1 ex.

Hylastes ater Payk. 1 ex.

» *linearis* Er. 1 ex.

» *attenuatus* Er. 1 ex.

ED. EVERTS.

Valgus hemipterus L.

In den vorigen jaargang der »Entomologische Zeitschrift« (XIX, N^o 28, pag. 160) kwam een opstel voor van Dr. von Rothenburg te Darmstadt, getiteld: Praktische coleopterologische Erfahrungen. Daarin werd de vraag opgeworpen, of *Valgus hemipterus* L. in koloniën leeft en zich ook in koloniën zou ontwikkelen.

In afl. 3 van den loopenden jaargang (XX, N^o 3, pag. 22) deelt Karl Frings mede, dat hij in de omstreken van Bonn, een vermolmden appelboomstam onderzoekend, daarin een groot aantal imagines dezer soort vond. In eenige minuten had hij een dertigtal kevers verzameld, terwijl het geheele aantal der aanwezige dieren door hem op over de 100 stuks wordt geschat.

Het kwam mij niet onbelangrijk voor, deze waarnemingen hier te vermelden, en daarbij in herinnering te brengen het