

*Ceuthorrhynchus pilosellus* Gylh., door Bedel uit Holland opgegeven.

*Carphoborus minimus* F., de vraatfiguren door Prof. Dr. Ritzeema Bos in Drenthe en in het Speulderbosch bij Putten op de Veluwe waargenomen.

Behalve deze weinige soorten ontbreken bovendien tal van rassen, variëteiten, vormen en aberraties van soorten waarvan het type vertegenwoordigd is, of wel omgekeerd dat wel eenige variëteit maar niet het type voorhanden is. Dan zijn van vele soorten de beide seksen nog niet vertegenwoordigd.

Ook is zeer gewenscht het aantal exemplaren van zeldzame soorten te vermeederen, de kennis der soort in zijne verschillende afwijkingen wordt daardoor bevorderd.

Ondergeteekende beveelt dan ook, om de hier opgesomde redenen, ten zeerste zijne collectie aan de collega's aan. Gaarne is hij bereid, zoo mogelijk, inlandsche exemplaren van uiterst zeldzame soorten of unica tegen uitlandsche exemplaren van die soorten in te ruilen. Door een dergelijk ruilverkeer was het vooral, dat deze inlandsche standaard-collectie zoo volledig geworden is.

ED. EVERTS.

**Coleoptera <sup>1)</sup> in de omstreken van Oldenzaal, Denekamp en  
Losser verzameld, Juli 1906.**

*Omophron limbatus* F.

*Elaphrus Ulrichii* W. Redt.

*Dyschirius obscurus* Gylh. <sup>2)</sup>

» *angustatus* Ahr.

*Bembidium obliquum* St.

<sup>1)</sup> De allergeewoonste soorten zijn hier weggelaten.

<sup>2)</sup> Deze soort was alleen van de zee kust bekend.

*Bembidium Doris* Gylh.

» *Mannerheimii* Sahlb.

*Epaphius secalis* Payk.

*Olisthopus rotundatus* Payk.

*Pterostichus angustatus* Dfts.

*Amara infima* Dfts.

**Harpalus rufus** Brüggem. (*ferrugineus* F.) Faun. nov. sp.

*Bradycellus verbasci* Dfts.

*Blechrus minutulus* Goeze.

*Haliphus flavicollis* St.

*Deronectes duodecimpustulatus* F.

» *depressus* F.

*Hydroporus rufifrons* Dfts.

» *memnonius* Nicolai type en ♀ var. *castaneus* Aubé.

*Agabus striolatus* Gylh.

» *affinis* Payk.

*Hydaticus seminiger* de G.

*Orectochilus villosus* Müll.

*Ocalea picata* Steph.

*Ilyobates nigricollis* Payk.

*Brachyusa concolor* Er.

**Tachyusa leucopus** Mrsh. Faun. nov. sp.

» *constricta* Er.

» *coarctata* Er. type en ab. e. *cyanea* Kr.

*Leptusa ruficollis* Er.

*Tachyporus tersus* Er.

*Quedius picipes* Mannh.

*Staphylinus fossor* Scop.

*Cryptobium fracticorne* Payk.

*Stenus palposus* Zett.

» *incanus* Er.

» *picipes* Steph.

» *geniculatus* Grav.

- Bledius denticollis* Fauv. <sup>1)</sup>  
*Bythinus securiger* Reichb.  
*Anisotoma dubia* Kugel (typus: *subglobosa* Reitt.).  
     »    *calcarata* Er.  
     »    *lucens* Fairm.  
*Cyrtusa pauxilla* Schmidt.  
*Epuraea neglecta* Heer.  
*Pria dulcamarae* Scop.  
*Rhizophagus politus* Hellw.  
*Antherophagus nigricornis* F.  
*Cryptophagus setulosus* St.  
     »    *pallidus* St.  
**Cis oblongus** Mellié, Faun. nov. sp.  
*Ennearthron affinis* Mellié.  
*Corticaria impressa* Oliv.  
     »    *serrata* Payk.  
*Limnichus sericeus* Dfts.  
*Georyssus crenulatus* Rossi.  
*Limnius Dargelasii* Latr.  
**Heterocerus intermedius** Ksw. Faun. nov. sp.  
*Laccobius nigriceps* Ths. ab. c. *maculiceps* Rottb.  
*Helophorus arvernicus* Mls.  
*Hydraena testacea* Curtis.  
*Aphodius plagiatus* L.  
*Trichius fasciatus* L. <sup>2)</sup>  
*Agrilus coeruleus* Rossi.  
*Throscus dermestoides* L.  
*Synaptus filiformis* F.  
*Malthodes ruficollis* Latr. type en ab. c. *marginicollis* Schilsky.  
**Mordellistena brevicauda** Boh. Faun. nov. sp.  
**Hylophilus nigrinus** Germ. Faun. nov. sp., een ♂.

<sup>1)</sup> De tweede vindplaats in Nederland.

<sup>2)</sup> Deze soort was nog alleen uit Zuid-Limburg bekend,



- Spondylis buprestoides* L.  
 » *maculata* Poda.  
*Leptura quadrifasciata* L.  
 » *attenuata* L.  
*Criocephalus fesus* Kr.  
*Liopus nebulosus* L.  
*Cryptocephalus pini* L.  
*Phyllobrotica quadrimaculata* L.  
*Aphthona lutescens* Gylh.  
*Longitarsis holsaticus* L.  
*Bagous cylindrus* Payk.  
*Orchestes erythropus* Germ.  
 » *avellanae* Donovan.  
*Magdalis memnonia* Gylh.  
 » *violacea* L.  
*Coeliodes rubicundus* Herbst.  
 » *trifasciatus* Bach.  
*Craponius epilobii* Payk.  
*Ceuthorrhynchidius pumilio* Gylh. ab. c. *posthumus* Germ.  
*Ceuthorrhynchus scapularis* Gylh.  
*Tapinotus sellatus* F.  
*Phytobius comari* Herbst.  
 » *Waltonii* Bohem.  
 » *quadricornis* Gylh.  
*Apion radiolus* Marsh., ab. c. *ferruginipes* Wenck.  
 » *Gyllenhalii* Kirby.  
*Crypturgus pusillus* Gylh.  
*Pityogenes bidentatus* Herbst.  
*Tomicus sexdentatus* Boerner.  
 » *proximus* Eichh.  
*Xyleborus Saxesenii* Ratzeb.