

## Excursie-bericht. Bladwespen.

Tijdens de excursie in de omstreken van Denekamp op 22 Juli 1906 ontving ik van den Heer Kempers eene *Cimbea fagi* ♀, zijnde het eerste wijfje in Nederland gevonden. Uit larven zijn zij herhaaldelijk door mij gekweekt. Jammer dat het fraaie exemplaar in de Cyankalium-flesch terecht gekomen was, zoodat ik het niet meer op beuk inbinden kon.

De larve van *Cimb. femorata* L. werd door den Heer Uyttenbogaart bij Oldenzaal en door mij bij Denekamp aangetroffen.

Van soorten, welke ik tot nog toe bij Arnhem niet opgemerkt had, zijn te vermelden:

*Arge pagana* Pz. ♂ en ♀ in copula. Het wijfje, op roos ingebonden, heeft gelegd; uit de eieren verkreeg ik een aantal larven.

*Arge* spec.; larve door den Heer Brants op berk gevonden. Het schijnt mij toe *Arge atrata* Forst. te zijn. Brischke vermoedt dat zij op eik, Rudow dat zij op els en *Salix fragilis* leeft; zij vrat ook els bij mij.

*Nematus* spec. op berk, larven, welke geheel op *Nem. luteus* van els geleken.

*Pachynematus xanthocarpus* Htg. syn. *caprae* Pz. rozenroode larfjes op zegge, *Carex* spec., en *Athalia* spec. waarschijnlijk *Scutellariae* Cam.; deze larven waren gesleept op eene vochtige plaats.

A. J. VAN ROSSUM.

---

 Invloed van het voedsel op *Croesus varus* Vill.

In de vergadering der Ned. Entom. Vereeniging te Oldenzaal werd door mij medegedeeld, dat het mij gelukt was parthenogenetische larven van *Croesus varus*, uit eieren op els gekweekt.