

zuiverder geel, ook de laatste ring aan de buikzijde en de achterpooten. Toen ik bij mijne *varus*-larven tusschen de berketakjes els plaatste gingen deze hier niet op over, maar bleven berk vreten.

De najaarslarven namen dus na voeding met berk reeds de donkere kleur aan; bij mijnen kweek in het voorjaar geschiedde dit niet, maar verkregen de larven uit ei der wespen (waarvan de larven berk gevreten hadden) pas de donkere kleur nadat zij uit ei op berk geboren waren. Misschien waren mijne larven in het voorjaar afkomstig uit moeder-wespen, die reeds een of meer generaties langer op els geleefd hadden, en hier den invloed nog van ondervonden.

A. J. VAN ROSSUM.

**Lijst van Neuropteroidea, gevonden bij Oldenzaal en Denekamp,
ter gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent.
Ver., Juli 1906.**

De rangschikking en nomenclatuur zijn naar Albarda's Catalogus (Tijdschrift v. Entomol., Deel 32 p. 211, 1888).

C o r r o d e n t i a.

Stenopsocus cruciatus L.

» *immaculatus* Steph.

Amphigerontia variegata F.

Psocus longicornis F.

» *nebulosus* Steph.

Elipsocus unipunctatus Müll.

Caecilius pedicularius L.

» *fuscopterus* Latr.

A g n a t h a.

Cloëon dipterum L.

O d o n a t a.

Diplax striolata Charp.

Calopteryx splendens Harris.

„ *virgo* L.

Lestes sponsa Haus.

Platycnemis pennipes Pall.

Agrion pulchellum v. d. Lind.

Planipennia.

Sisyra fuscata F.

Chrysopa ventralis Curt.

» *perla* L.

Drepanopteryx phalaenoides L.

Coniopteryx lactea Wasm.

Panorpa vulgaris Imh.

» *germanica* L.

Trichoptera.

Limnophilus auricula Curt.

» *sparsus* Curt.

Leptocerus aterrimus Steph.

» *cinereus* Curt.

» *dissimilis* Steph.

Mystacides nigra L.

» *azurea* L.

* *Setodes interrupta* F. Faun. nov. sp.

Wormaldia subnigra Mac Lachlan.

Neureclipsis bimaculata L.

Polycentropus flavomaculatus Pict.

Cyrnus trimaculatus Curt.

Lype phaeopa.

H. W. VAN DER WEELE.

De Redactie verzoekt alle ter plaatsing aan te bieden stukken in te zenden bij Dr. J. Th. Oudemans, Paulus Potterstraat 12, Amsterdam.
