

*aurita*, *repens* behooren alle tot de Vroegbloeiërs. Op een eveneens vroeg bloeiende gladde wilg, *S. viminalis*, schijnt de larve nog niet gevonden te zijn. In de omgeving van Arnhem heb ik haar nog niet aangetroffen; bij Vlodrop (Limburg) klopte ik haar in 1903 uit *S. aurita*, en Mr. Brants bezorgde mij de larve ook reeds in 1904 uit Laag-Soeren. Deze beide kweekingen mislukten, gedeeltelijk ten gevolge van sluipwespen. De mannetjes van *Am. fallax* zijn schaarsch; Cameron geeft aan: »On counting the specimens which I have caught and bred, I find a proportion of one male to twenty females«. (Monogr. Brit. Phytoph. Hym. I p. 26). Door Brischke<sup>1)</sup> wordt aangenomen, dat *Am. fallax* Lep. en *Am. histrio* Lep. slechts variëteiten van eene soort zijn; Konow kan zich hiermede niet vereenigen. In afbeeldingen der zagen van *fallax* en *histrio* door Cameron is verschil op te merken.

A. J. VAN ROSSUM.

### • *Lycaena coridon* Poda.

#### *Lycaena coridon* Poda in Nederland.

Deze zeldzame *Lycaena* werd het eerst in ons land aangetroffen door Dr. van Medembach de Rooy, die in Augustus 1859 een mannetje bij Nijkerk ving. Dit voorwerp, dat natuurlijk een weinig oud geworden, doch volkomen gaaf is, berust in mijne verzameling. Het bleef zeer lang het eenige Nederlandsche exemplaar, terwijl bovendien Snellen in »De Vlinders van Nederland« Macrolepidoptera, p. 56 noot, in verband met het terrein, dat volstrekt niet met den aard van deze soort over-

<sup>1)</sup> Schrift. Naturf. Ges. Danzig N. F. VI. Heft 2. p. 74

eenstemde, zegt te aarzelen, om haar onder de inheemsche vlinders op te nemen. Dit was m. i. volkomen terecht, daar het veel verstandiger is, om met het als inlandsch beschouwen eener ietwat dubieuse soort te wachten, totdat betere bewijzen voorhanden zijn, dan eene ontijdig als zoodanig beschouwde wederom te doen vervallen.

Aldus bleef de indigeniteit van *Lycaena coridon* onzeker, totdat, gelijk Snellen in »De Vlinders van Nederland«, Microlepidoptera, p. 1126, mededeelt, deze soort in Zuid-Limburg bij Valkenberg en Maastricht door Mr. A. H. Maurissen werd gevangen. Sedert het verschijnen van dit deel van Snellen's meesterwerk, 1882, hoorde men niets meer van haar.

Thans kan ik twee nieuwe vindplaatsen opgeven, nl. Bergen-op-Zoom en Hoog-Keppel. Op ongeveer één uur ten zuiden van eerstgenoemde stad werd een mannetje gevangen door den heer N. Bouman (Amsterdam) op 10 Augustus 1906, terwijl de heer G. J. Klokman J. Az., eveneens in den afgelopen zomer, nabij laatstgenoemde plaats drie voorwerpen bemachtigde, en wel op het landgoed »Ulenpas« op 23, 27 en 30 Juli.

In zijn schrijven over deze vangsten deelt de heer Klokman mij bovendien nog mede, dat hij zich herinnert, dat in Juli 1904, na de vergadering en excursie onzer Vereeniging, nog eene excursie door eenige leden gemaakt werd naar Neede en dat toen ook een exemplaar van *Lycaena coridon* gevangen werd. Ik vind deze vangst nergens vermeld; moge deze mededeeling de nadere bevestiging uitlokken.

J. TH. OUDEMANS.

---