

Maritieme Coleoptera bij Rotterdam.

In de nabijheid van Rotterdam bevinden zich vrij uitgestrekte zandvlakten; naar ik meen is dit »opgespoten« zand, afkomstig van 't uitbaggeren van onze riviermonden. Voor eenige jaren vond ik op een dergelijk terrein bij IJsselmonde *Cicindela maritima* Latr., een soort, die uitsluitend op de laatste duinenrij wordt aangetroffen. Naar 't schijnt heeft de soort zich daar niet staande gehouden: 't terrein is nu bijna geheel begroeid, wat wellicht de reden is dat 't dier daar niet meer voorkomt.

Dezer dagen vond ik echter op een opgehoogd terrein tusschen Rotterdam en Schiedam genoemde *Cicindela* in groot aantal. 't Terrein is bijna geheel met lage planten begroeid: op de open zandvlakten zit 't insekt.

Zeer zeker is 't aangevoerd. En ik vind 't daarom de moeite waard erop te wijzen, omdat de afstand niet gering is. Hoek van Holland is de dichtst bijzijnde vindplaats.

't Aanvoeren als imago is m. i. niet aan te nemen door de groote beweeglijkheid van de Cicindelidae.

't Doet denken aan 't voorkomen van *Cicindela trisignata* Latr. bij Oostvoorne, al is de afstand, vanwaar de soort aangevoerd kan zijn zooveel grooter: Cap de Carteret (dép. Manche) is de dichtst bijzijnde vindplaats¹⁾.

Behalve dezen zandloopkever vond ik op 't terrein *Amara convexiuscula* Mrsh en *Bembidion bipunctatum* L.

Voor al de *Amara* is een soort, die op ziltige gronden leeft.

De *Bembidion*, over 't algemeen zeer zeldzaam, bevindt zich soms in aantal op zilte plaatsen. Nog vond ik van *Cicindela maritima* een duidelijk groen gekleurd exemplaar (een zeldzame afwijking).

In elk geval zal 't de moeite loonen na te gaan of de genoemde soorten in 't vervolg op 't terrein blijven.

¹⁾ Everts, Tijdschrift 1904.