

Over de levenswijze van *Coelambus novemlineatus* St.

Op 't eind van September bevond ik me aan een onder water staande afzanderij, een terrein waar ik vroeger meermalen *Coelambus 9-lineatus* gevonden had. Ofschoon ik nu de geheele plas rondliep zag ik maar 1 ex. Dit verwonderde me, daar 't warm, zonnig weer was. Ik kwam nu op de gedachte 't zand aan de kanten op te woelen. Nu kwamen de kevers in aantal te voorschijn. Ik bleef nog geruimen tijd toekijken of geen ex. boven kwam om te ademen, maar niets was te zien. Bij 't opwoelen van den bodem kwamen ze weer. De dieren schijnen 't dus vrij lang onder water te kunnen uithouden.

Nog wilde ik hierbij 't volgende opmerken: *Coelambus 9-lineatus*, een overigens zeldzame soort, scheen de eenige waterkever te zijn, die de afzanderij in aantal bewoonde. Behalve nog een enkelen *Bidessus* en *Ilybius* vond ik geen leven. De in 't voorjaar daar door mij altijd in groot aantal gevonden kleinere Dytisciden ontbraken nu geheel.

A. RECLAIRE.

***Amara cursitans* Zimm. en *Timarcha metallica* Laich.
in Nederland.**

In Augustus van dezen zomer te Vaals zijnde, sloeg ik de oude weg naar de »Vierländerblick« in. Dicht bij 't punt waar de nieuwe weg naar den uitzichtstoren gaat, is een onbegroeide helling. Daar vond ik onder steenen 2 *Amara*'s: ze kwamen me op 't oog onbekend voor; 't bleek me later dat 't *Amara cursitans* Zimm. was, nieuw voor onze fauna. Ongetwijfeld komt de soort daar in aantal voor: ik had slechts korten tijd, zoodat ik me niet lang op de plek kon ophouden.

Boven op den berg liggen onder berkenaanplanting veel steenen.

Behalve *Olistophus rotundatus*, die daar vrij gemeen schijnt te zijn, vond ik daar een ex. van *Timarcha metallica* Laich., eveneens nieuw voor ons gebied. Ongetwijfeld zal de berg bij Vaals veel nieuws opleveren bij grondig onderzoek. ¹⁾

A. RECLAIRE.

Cicadologische Aanteekeningen V.

◊ * *Liburnia striatella* Fall. — Faun. nov. sp.

Arnhem, Juni, één ♀.

In Engeland en Duitschland gevonden, was deze soort ook hier wel te verwachten.

◊ *Liburnia elegantula* Boh. —

Arnhem (Sonsbeek), Juli, Aug.

Een 10-tal brachyptere ♂♂ en ♀♀ in mijne collectie.

De ♀♀ vond ik reeds vroeger, maar ze waren als zoodanig niet te herkennen, totdat ik — feitelijk door toeval — ook de ♂♂ er bij vond. Ik spreek van toeval, daar de ♂♂ zóó klein, en hun teekening, vorm, kortom de heele habitus zóó afwijkend was, dat men ze meestal wel overzien zal. Van alle mij bekende *Liburnia*'s is de sexueele dimorphie hier wel het sterkst ontwikkeld.

Tot dusver wat ons land betreft, alleen uit Rhenen vermeld (Mr. Fokker).

◊ * *Liburnia exigua* Boh.

Arnhem (Mariëndaal), Juli; 3 exemplaren waaronder één macr. ♂ en een brach. paartje.

Was, evenals *striatella*, in ons land te verwachten.

¹⁾ De Heer Everts bevond de determinatie van genoemde soorten juist.