

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 40.

DEEL II.

1 Maart 1908.

INHOUD: Jhr. Dr. ED. EVERTS, *Callidium* (*Pyrrhidium*) *sanguineum* L. — Jhr. Dr. ED. EVERTS, *Phytosus nigriventris* Chevr. — Dr. A. C. OUDEMANS, Aanteekeningen over *Suctoria* VII. — Dr. A. J. VAN ROSSUM, Mededeelingen over Bladwespen III. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek. Geschenken en Aankopen. — Dr. C. L. REUVENS, Vriendelijk verzoek.

Callidium (*Pyrrhidium*) *sanguineum* L.

Deze fraaie, roode boktor werd door den Heer E. VON VARENDORFF, Amtsrichter in Guhrau, Bez. Breslau, tijdens een kort verblijf te Scheveningen, aldaar langs het strand onder aangespoeld riet aangetroffen. Het komt dezen heer voor, dat deze soort zich daar zou ontwikkelen uit eikenpalen of planken, waarmede gedeelten in de duinen afgezet zijn; hij meent zelfs den »Frass» gezien te hebben. Het exemplaar werd mij welwillend voor mijne collectie afgestaan.

ED. EVERTS.

Phytosus nigriventris Chevr.

Deze, voor zoover mij bekend, nog niet in Nederland waargenomen strand-Staphylinide, werd door Dr. C. URBAN te

Magdeburg, bij le Coq s. M. langs de Belgische kust gevangen en welwillend een exemplaar voor mijne collectie afgestaan.

Van de vermelding »Holl.» in den Catalogus Coleopter. Europae etc., auct. L. v. Heyden, E. Reitter, J. Weise, blz. 189, is mij nog niet gelukt iets naders te weten te komen. Het is wenschelijk onze strandkever-fauna, vooral ook langs de Noordzee-eilanden, aan een grondig onderzoek te onderwerpen; veel goeds en nieuws is daar nog te ontdekken. In hoever het voorkomen van deze soort op het Noord-duitsche eiland Wangeroog (Wiepken) juist is, kan ik niet nagaan; verwisseling met den zeer algemeenen *Phytosus balticus* Kr. is niet geheel uitgesloten.

ED. EVERTS.

Aanteekeningen over Suctorla VII.

Voor ik overga tot het bespreken der genera na 1880, het jaar, waarop, door het baanbrekend werk van TASCHENBERG, de wetenschap der *Suctoria* in eene nieuwe periode getreden is, wil ik eerst nog eenige feiten mededeelen, die ik ontdekte bij de studie der periode vóór 1881.

I.

De volgende soort-namen vind ik niet door RITSEMA, TASCHENBERG, of BAKER vermeld:

1837. *Pulex boris* LEACH apud CURTIS, Guide, 2^d Ed., p. 230. (certe = *irritans*).

1844. *Pulex serraticeps* GERVAIS in GERVAIS et WALCKENAER Histoire naturelle des Insectes, Aptères, v. 3, p. 371, door hem gevonden op *Procyon lotor*, is stellig niet = *Ctenocephalus canis* CURTIS, zooals algemeen aangenomen wordt. Ook de beschrijving past niet.

1844. *Pulex* sp. GERVAIS, ibidem, p. 372, op *Procavia syriaca* (SCHREB.).