

noch aan larven van kikvorschen of salamanders kleuring te weegbrengen, hoewel volgens anderen juist amphibiën hierdoor vitaal gekleurd worden.

De verhandeling is van fraai gekleurde afbeeldingen van Cladoceeren (Watervlooien) voorzien. De beste resultaten werden verkregen met *Neutraalrood*, waaromtrent de schrijver zegt: „Dieser Körper ist der vitale Farbstoff kat'exochen!“

A. J. VAN ROSSUM.

### Riolus Mulsantii Kuw. in Nederland teruggevonden.

EVERTS vermeldt in zijn *Coleoptera Neerlandica* Deel I, pag. 628, dat *Riolus Mulsantii* Kuw. volgens KUWERT in Holland zou gevangen zijn; de soort ontbreekt echter in alle inlandsche collecties en behoort tot de weinige soorten, die in de standaardcollectie van EVERTS niet vertegenwoordigd zijn. (Zie Entom. Berichten No. 32, pag. 136). In 1907 werd door ondergeteekende met Mr. L. H. D. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL een plekje in de Gulp dicht bij Gulp en gevonden, waar eenige wilgen vlak bij den oever stonden, zoodanig, dat hun wortels gedeeltelijk door het water ondermijnd waren. Door nu de wortelpruik met het waternet als het ware af te schrappen, gelukte het ettelijke Parniden en andere waterkevers machtig te worden, die men anders slechts zelden vindt. Met name was *Lareynia aenea* Müll. in aantal te vinden. *Lareynia obscura* Müll. werd toen in twee exemplaren, nieuw voor de fauna buitgemaakt. Ook *Elmis Volkmaria* Panz. kwam voor. Van *Riolus cupreus* Müll. werden toen vier exemplaren bemachtigd. Deze soort was slechts eenmaal bij Houthem in ons land gevangen.

Dit jaar hetzelfde plekje weer grondig onderzoekende werden *Lareynia aenea* Müll. en *Elmis Volkmaria* Panz.<sup>1)</sup> in groot

<sup>1)</sup> Deze alleen uit Limburg bekende kever werd dit jaar in Juli door mij in één exemplaar in de beek van Beekhuizen bij Velp gevonden.

aantal aangetroffen. Van *Lareynia obscura* Müll. gelukte het slechts één exemplaar te vinden. *Riolus cupreus* Müll. ontbrak; daarentegen werden dit jaar drie exemplaren van den tot nu toe vergeefs gezochten *Riolus Mulsantii* Kuw. gevonden. Jammer genoeg miste een dezer exemplaren den kop.

Beide jaren werden *Orectochilus villosus* Müll., *Hydroporus Saumarkii* Sahlb. en *Platambus maculatus* L. in meerdere exemplaren op dezelfde wijze buitgemaakt, eveneens eenige exemplaren van *Hydraena atricapilla* Waterh.

In een ophaal van het net werd ook een defekte *Dianous coerulescens* Gylh. gevonden, blijkbaar uit het mos aan den oever afkomstig. Iets meer in den stroom van het beekje zelf kwam *Brychius elevatus* Panz. in groot aantal voor.

Het leek mij de moeite waard een dergelijke goede vangst, waardoor een der leemten van de standaardcollectie aangevuld wordt, in deze berichten mede te deelen.

D. MAC GILLAVRY.

## BIBLIOTHEEK.

### A a n k o o p e n.

- K. Lampert, Die Grossschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Verhältnisse. Esslinge, München 1907. Met gekl. pln. en fig. Gr. 8<sup>o</sup>.
- J. H. Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Classe der Insecten. Stuttgart 1874. Met fig. 8<sup>o</sup>.
- R. Verity, *Rhopalocera palaeartica*. Afl. 15—16.
- C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin. Kiel-Altona 1817—18. T. I.